Sebenta de Cálculo I

Capítulo 2. Funções Reais de Uma Variável Real. Derivadas.

Bragança, Outubro 2021
Mário Abrantes

Matérias do Capítulo 2

2 Funções Reais de Variável Real	3
1 Noções elementares	3
1.1 Definição de função	3
1.2 Gráfico de uma função	6
1.3 Classificação das funções quanto à sua representação analítica	8
1.4 Operações sobre funções	8
Operações racionais.	8
Função composta	9
Função inversa	10
1.5 Funções elementares	11
Funções constantes	11
Funções potência	11
Funções exponenciais	12
Funções logarítmicas	12
Funções trigonométricas directas	13
Funções trigonométricas inversas	14
2 Sequências numéricas	15
2.1 Vizinhança de um número real	15
2.2 Definição de sequência numérica	16
2.3 Limite de uma sequência numérica	18
Limites infinitos	18
Alguns teoremas sobre limites de sequências numéricas	19
3 Funções contínuas	20
3.1 Limite de uma função	20
3.1.1 Limites laterais	20
3.1.2 Alguns teoremas sobre limites de funções	21
3.1.3 Limites no infinito	22
3.2 Função contínua	22
3.2.1 Alguns teoremas sobre continuidade	24
3 Derivadas de Funções Reais de Variável Real	26
1 Função derivada	26
1.1 Taxa de variação média de uma função	26
1.2 Taxa de variação instantânea de uma função. Função derivada	28
1.3 Derivadas laterais	32
2 Derivadas de algumas funções elementares. Regras de derivação	33
2.1 Derivadas de algumas funções elementares	34
Funções constantes	34
Funções potência	34
Funções exponenciais	35
Funções logarítmicas	36
Funções trigonométricas directas	36
2.2 Derivadas de somas, produtos e divisões de funções	37
2.3 Derivada da função composta	39
2.4 Derivada da função inversa	39
3 Teoremas relativos a funções deriváveis	41
4 Derivadas de ordem superior	41
5 Derivada da função implícita	42

Capítulo 2

Funções Reais de Variável Real

1 Noções elementares

1.1 Definição de função

Uma função representa uma relação entre grandezas numéricas. As funções que vamos estudar neste capítulo relacionam apenas duas grandezas numéricas, sejam elas x e y , e escrevem-se geralmente da forma $y = f(x)$. Esta expressão deve ser lida da seguinte forma (figura 1):

- f é a designação (o nome) da função, sendo x e y as designações das grandezas que a função relaciona. Podem usar-se quaisquer outras letras, ou sequências de letras, para os nomes da função e das grandezas relacionadas;
- x representa cada elemento de um conjunto de valores que conhecemos. Designa-se por *variável independente*, uma vez que o seu valor pode ser escolhido livremente nesse conjunto de números;
- y representa o valor assumido pela expressão $f(x)$. Designa-se por *variável dependente*, uma vez que o seu valor não pode ser escolhido livremente, dependendo do valor de x e da fórmula $y = f(x)$. A cada valor de x corresponde um só valor de y .

Se x só pode assumir valores reais, a função diz-se *de variável real*. Se y também só assumir valores reais, a função diz-se *real*. Em resumo, uma função $y = f(x)$ em que tanto y quanto x tomam apenas valores reais, diz-se *função real de variável real*.

Figura 1: Uma função pode ser vista como uma máquina que recebe x e produz $f(x)$.

Vídeo . 2.1 (no anexo deste capítulo)

Exemplo 1.

1. O termómetro representado na figura 2, relaciona a *temperatura ambiente* T com a *altura* h de uma coluna de mercúrio. A escala na esquerda do termómetro representa a temperatura em graus *Celsius* ($^{\circ}C$), usada na Europa; a escala na direita representa a temperatura em graus *Fahrenheit* ($^{\circ}F$), usada nos Estados Unidos da América. A

temperatura y , em graus *Fahrenheit*, e a temperatura x , em graus *Celsius*, relacionam-se por meio da função,

$$y = 1.8x + 32.$$

Por exemplo, a $x = 20$ graus Celsius correspondem $y = 68$ graus Fahrenheit.

2. A distância d , em quilómetros, percorrida por um automóvel, e o tempo t de duração de uma viagem, em horas, relacionam-se por uma função que tem a representação genérica $d = f(t)$. Se o automóvel se desloca à velocidade constante de 50km/h , a função que relaciona a distância percorrida, d , com duração do percurso, t , é dada por

$$d = 50t.$$

Se a duração da viagem for de $t = 1.5$ horas, a distância percorrida é $d = 50 \times 1.5 = 75$ quilómetros. Se suposermos que o automóvel, quando inicia uma viagem à velocidade constante de 50km/h , se encontra já à distância de 80km do local L relativamente ao qual se mede a distância d , obtemos a seguinte função para d em função do tempo de viagem, t

$$d = 50t + 80.$$

Uma hora depois de iniciada a viagem, a distância a que o automóvel se encontra do local L é $d = 50 \times 1 + 80 = 130\text{km}$.

3. Seja $q = f(p)$ a função relaciona o número de unidades vendidas, q , de um certo produto, com o preço de mercado p de cada unidade desse produto. Quanto menor for o preço de cada unidade, maior tende a ser o número de unidades vendidas, porque o que é mais barato vende geralmente mais. Uma função deste tipo designa-se por *função de procura* do produto. Suponhamos que se tem

$$q = 400 - 3p.$$

Esta função diz-nos que se o preço por unidade do produto for $p = 4\text{€}$, então $q = 400 - 3 \times 4 = 388$, o que significa que são vendidas 388 unidades do produto.

Figura 2: Termómetro de mercúrio.¹

Podemos agora estabelecer uma ideia mais formal de função, que vai ser útil no nosso estudo. Uma função $y = f(x)$ é definida por três entidades:

¹(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bt.tempMeter>).

1. o conjunto A de valores que a variável independente x pode assumir, designado por *domínio* da função. Os elementos do domínio designam-se por *objectos* da função. No caso da função no ponto 1 do exemplo anterior, o domínio é o conjunto das temperaturas ambiente possíveis. Por exemplo, pode ser razoável, num dado local, tomar como domínio o conjunto $[-5, 35]$ (graus Celsius);
2. um conjunto B que contém todos os valores que a variável dependente y pode assumir (podendo conter outros elementos), designado por *contradomínio* da função. *Imagem* de uma função, é o conjunto dos valores efectivamente assumidos pela função;
3. uma regra que exprime o modo como cada valor de x é feito corresponder à sua imagem y (em geral esta regra é descrita por meio de uma equação).

Para se indicar que uma função f tem por domínio o conjunto A e por contradomínio o conjunto B , escreve-se $f : A \rightarrow B$.

Exemplo 2.

1. A função que exprime a distância de um veículo ao ponto de início de uma viagem (ponto 2. do exemplo 1), $d = 50t + 80$, pode ser definida da forma

$$d : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow [80, +\infty[, \quad d(t) = 50t + 80.$$

Esta função é um *modelo matemático* do movimento do veículo. Podemos usá-la para conhecer, em qualquer instante t , a posição do veículo relativamente ao ponto de partida. Mas não é o único modelo possível. Podemos estar interessados em conhecer a posição do veículo apenas durante as primeiras 2h do seu movimento, que é dada pela função

$$d : [0, 2] \rightarrow [80, 180], \quad d(t) = 50t + 80.$$

2. A função que exprime o volume v de uma esfera em função do seu raio r é

$$v : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad v(r) = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

3. A relação definida no esquema da figura 3 não representa uma função de A em B , porque ao elemento 1 no conjunto A corresponde, por f , mais do que um elemento em B . Certos autores designam relações deste tipo por *funções plurívocas* (um objecto pode ter várias imagens). No nosso estudo usamos o termo *função* para referir uma relação unívoca do domínio para o contradomínio.

Figura 3: f define uma relação entre conjuntos que não é *unívoca* de A para B .

É importante salientar que, ao definir-se uma variável y como função de outra variável x , tal como aqui o fazemos, é entendido que a cada valor do domínio assumido pela variável x corresponde *um só valor* do contradomínio assumido pela variável y .

Dada uma função $y = f(x)$ definida num intervalo I de números reais, se para quaisquer dois valores $a, b \in I$ se verifica:

- $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$, então diz-se que a função f é *crescente* no intervalo I ;
- $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$, então diz-se que a função f é *decrecente* no intervalo I ;
- $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$, então diz-se que a função f é *não decrescente* no intervalo I ;
- $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$, então diz-se que a função f é *não crescente* no intervalo I .

A função f diz-se *monótona* se é de algum dos 4 tipos anteriores.

Exemplo 3. A função representada na figura 4: é crescente no intervalo (a, b) e no intervalo (c, d) ; é não decrescente no intervalo (a, c) ; é decrescente no intervalo (d, e) .

Figura 4

Exemplo 4. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = \sqrt{x}$ é crescente em todo o seu domínio porque $a < b \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$.

1.2 Gráfico de uma função

Gráfico de uma função $y = f(x)$ é o conjunto de todos os pares ordenados $(x, f(x))$, $x \in D_f$, sendo D_f o domínio da função. O gráfico de uma função real de variável real é pois um conjunto de pares de números reais, embora normalmente se designe também por gráfico da função qualquer representação deste conjunto de pontos num referencial cartesiano.

Exemplo 5. O gráfico da função $f(x) = x^2$ é o conjunto que contém, entre outros, os elementos (x, y) seguintes: $(1, 1)$, $(-3, 9)$, $(0.1, 0.01)$, isto é, pares ordenados da forma (x, x^2) , com $x \in \mathbb{R}$.

Uma função $f: A \rightarrow B$ diz-se

- *Injectiva*, se cada elemento $y \in B$ é imagem de apenas um elemento de $x \in A$. A função representada na figura 5 não é injectiva.²
- *Sobrejectiva*, se cada elemento $y \in B$ é imagem de algum elemento do domínio A . Dito de outra forma, f é sobrejectiva se a imagem de f e o contradomínio de f são conjuntos iguais. A função representada na figura 5 não é sobrejectiva porque o elemento b (por exemplo) do contradomínio não pertence à imagem da função. A função representada na figura 6 é sobrejectiva;

²Não confundir a definição de *função injectiva* com a definição de *função unívoca* (ver ponto 3 do exemplo 2).

- *Bijectiva*, se é injectiva e sobrejectiva (ver figura 6).

Figura 5: f não é injectiva porque os objectos 1 e 2 têm a mesma imagem, i.e., $f(1) = f(2) = a$.

Figura 6: f é bijectiva.

Exemplo 6.

1. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = x^2$, representada na figura 7, não é injectiva, porque o seu domínio possui elementos diferentes que têm a mesma imagem. Por exemplo, $x = -2$ e $x = 2$ pertencem ao domínio da função, e $f(-2) = (-2)^2 = 4 = f(2)$.
2. A função $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = x^2$, representada na figura 8, é injectiva, porque o seu domínio não possui elementos diferentes que tenham a mesma imagem.

As funções são ambas sobrejectivas

Figura 7: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = x^2$.

Figura 8: $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = x^2$.

Exemplo 7. A função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = \ln(x)$, não é sobrejectiva (figura 9), porque o seu contradomínio possui elementos que não são imagem de algum elemento do domínio. Por exemplo, nenhum dos valores do intervalo $(\ln(2), \ln(3))$ pertence à imagem da função.

Figura 9: $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = \ln(x)$.

Vídeos . 2.2 a 2.7 (no anexo deste capítulo)

1.3 Classificação das funções quanto à sua representação analítica

As funções admitem uma classificação quanto à sua *representação analítica*, i.e., quanto ao tipo de expressão matemática $f(x)$ que lhes corresponde.

1. *Funções algébricas*: são representadas por *expressões algébricas* numa dada variável, ou seja, expressões envolvendo um número finito de adições, subtracções, multiplicações, divisões e extracções de raiz. As funções algébricas podem ser de dois tipos:

- (a) *Racionais*: nas operações com raízes, os radicandos não contêm a variável x . As funções racionais podem ainda classificar-se como:

- *funções inteiras* (ou *polinómios*)

$$y = 2x^3 - 3x + 2 \quad y = \sqrt{3}x^5 - \frac{3}{4}x^3 \quad y = 3;$$

- *funções fraccionárias* (divisões de polinómios): esta classe de funções contém as funções inteiras;

$$y = x^4 - 3x + 2 \quad y = \frac{1-x}{x^2+2x} \quad y = \frac{2}{x-3}$$

- (b) *Irracionais*: nas operações com raízes, há radicandos que contêm a variável x .

$$y = 1 - \sqrt[3]{x} \quad y = \frac{1-x}{2 + \sqrt[5]{1-x}} \quad y = 1 - x^{\frac{1}{4}}.$$

2. *Funções transcendent*: são as funções que não são algébricas.

$$y = e^x \quad y = \ln(x) \quad y = \text{sen}(x).$$

1.4 Operações sobre funções

Operações racionais.

Sejam f e g duas funções quaisquer, de domínios D_f e D_g e contradomínios CD_f e CD_g . Definem-se as operações de adição, subtracção, multiplicação e divisão destas duas funções do modo seguinte.

- Adição / Subtracção: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$, $D_{(f \pm g)} = D_f \cap D_g$.
- Multiplicação: $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, $D_{(f \cdot g)} = D_f \cap D_g$.
- Divisão: $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$, $D_{(f/g)} = (D_f \cap D_g) \setminus \{\text{zeros de } g(x)\}$.

Exemplo 8. Para as funções

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}_0^+, & f(x) &= x^2 \\ g: \mathbb{R}_0^+ &\rightarrow \mathbb{R}_0^+, & g(x) &= \sqrt{x} \end{aligned}$$

temos

- $(f + g)(x) = x^2 + \sqrt{x}$, $D_{(f+g)} = \mathbb{R} \cap \mathbb{R}_0^+ = \mathbb{R}_0^+$.
- $(f \cdot g)(x) = x^2 \sqrt{x} = x^{5/2}$, $D_{(f \cdot g)} = \mathbb{R} \cap \mathbb{R}_0^+ = \mathbb{R}_0^+$.
- $(f/g)(x) = x^2/\sqrt{x} = x^{3/2}$, $D_{(f/g)} = (\mathbb{R} \cap \mathbb{R}_0^+) \setminus \{0\} = \mathbb{R}^+$.

Vídeo . 2.8 (no anexo deste capítulo)

Função composta

Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ duas funções. Define-se a função $(g \circ f)(x)$, que se lê “função composta de f com g ” ou “ g após f ”, da forma

$$(g \circ f) : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Exemplo 9. A figura 10 representa a composição $(g \circ f)(x)$ de duas funções f e g . Pode observar-se que

$$f(4) = 2 \quad g(2) = 3,$$

e por isso

$$(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(2) = 3.$$

Figura 10: Função composta.

Para podermos definir a função composta de f com g , não é necessário que a imagem de f e o domínio de g sejam iguais, bastando que a primeira esteja contido no segundo, i.e. $\text{Imagem}_f \subset D_g$.

Exercício 1. Calcular $(g \circ f)(1)$ usando os dados da figura 10.

Exemplo 10. Dadas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - x + 1$ e $g : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $g(x) = \sqrt{x}$, podemos escrever a função composta de g com f

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(\sqrt{x})^2 - \sqrt{x} + 1 = 2x - \sqrt{x} + 1, \quad D_{f \circ g} = \mathbb{R}_0^+,$$

e podemos também escrever a função composta de f com g

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{2x^2 - x + 1}.$$

Verificamos assim que, em geral, se tem $f \circ g \neq g \circ f$.

Podemos compor um número qualquer de funções.

Exemplo 11. Considerar as funções $f(x) = 2x^2 + 1$, $g(x) = 3x$ e $h(x) = \sqrt{x}$. Temos

$$(f \circ g \circ h)(x) = (f \circ (g \circ h))(x) = f(g(h(x))).$$

Como $g(h(x)) = 3\sqrt{x}$, fica $f(g(h(x))) = 2(3\sqrt{x})^2 + 1 = 18x + 1$.

A operação de composição goza da *propriedade associativa*, i.e.

$$(f \circ (g \circ h))(x) = ((f \circ g) \circ h)(x).$$

Vamos verificar esta propriedade com as funções do exemplo anterior. Já calculámos a expressão no primeiro membro, $(f \circ (g \circ h))(x)$. A expressão no segundo membro é $((f \circ g) \circ h)(x) = ((18x^2 + 1) \circ h)(x) = 18x + 1$.

Vídeos . 2.9 a 2.11 (no anexo deste capítulo)

Função inversa

Seja $f : A \rightarrow B$ uma função bijectiva. Diz-se *função inversa* de f , e escreve-se f^{-1} , a função $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que, para todo elemento $y \in B$ se tem $f^{-1}(y) = x$, sendo $y = f(x)$, i.e. (figuras 11 e 12)

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \text{ e } (f \circ f^{-1})(y) = y.$$

Figura 11: f é a função inversa de f^{-1} .

Figura 12: f^{-1} é a função inversa de f .

Exemplo 12. A função $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = x^2$, representada na figura 8, pg. 7, é uma função bijectiva. A função inversa de f , f^{-1} , determina-se da seguinte forma:

1. Resolver em ordem a x a equação $y = x^2$, $x \geq 0$. Obtém-se $x = \sqrt{y}$;
2. Trocar as letras 'x' e 'y' nesta equação. Obtém-se $y = \sqrt{x}$. Esta troca serve apenas para escrever a fórmula na forma habitual (x é a variável independente e y a variável dependente);
3. A função inversa é $f^{-1} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Exemplo 13. A função $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, é uma função bijectiva. A sua função inversa determina-se da seguinte forma:

1. Resolver em ordem a x a equação $y = \ln(x)$. Obtém-se $x = e^y$;
2. Trocar as letras 'x' e 'y' nesta equação. Obtém-se $y = e^x$;
3. A função inversa é $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(x) = e^x$.

Vídeos . 2.12 a 2.15 (no anexo deste capítulo)

1.5 Funções elementares

A grande parte das funções que vamos encontrar no nosso curso são *funções elementares*. Uma função diz-se elementar se é alguma das seguintes funções:

- uma constante
- uma potência
- uma exponencial
- um logaritmo
- uma função trigonométrica directa
- uma função trigonométrica inversa
- uma combinação de funções dos tipos acima referidos, usando um número finito de operações racionais $+$, $-$, $\times$, $\div$ e de composição de funções.

Segue-se uma descrição destas funções.

Funções constantes

$$f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$D_f = \mathbb{R} \quad \text{Imagem}_f = \{c\}$$

$$\text{Exemplos: } f(x) = -2 \quad f(x) = \pi$$

Figura 13: Função constante $f(x) = c$.

Funções potência

$$f(x) = x^r, \quad r \in \mathbb{R}$$

D_f, Imagem_f : dependem de r

$$\text{Exemplos: } f(x) = x^2 \quad f(x) = \sqrt[3]{x} \quad f(x) = x^{-2,1}$$

(figuras 14, 15, 16, 17)

Figura 14: $D_f = \mathbb{R}, \text{Imagem}_f = \mathbb{R}_0^+$.

Figura 15: $D_f = \mathbb{R}, \text{Imagem}_f = \mathbb{R}$.

Figura 16: $D_f = \mathbb{R}_0^+$, $\text{Imagem}_f = \mathbb{R}_0^+$. Figura 17: $D_f = \mathbb{R}$, $\text{Imagem}_f = \mathbb{R}$.

Funções exponenciais

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

$$D_f = \mathbb{R} \quad \text{Imagem}_f = \mathbb{R}^+$$

$$\text{Exemplos: } f(x) = e^x \quad f(x) = 2^x \quad f(x) = 0.5^x$$

(figuras 18, 19)

Figura 18: $D_f = \mathbb{R}$, $\text{Imagem}_f = \mathbb{R}^+$. Figura 19: $D_f = \mathbb{R}$, $\text{Imagem}_f = \mathbb{R}^+$.

Funções logarítmicas

$$f(x) = \log_a(x), \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

$$D_f = \mathbb{R}^+ \quad \text{Imagem}_f = \mathbb{R}$$

$$\text{Exemplos: } f(x) = \ln(x) \quad f(x) = \log_{0.5}(x) \quad f(x) = \log_{10}(x)$$

(figuras 20, 21)

Figura 20: $D_f = \mathbb{R}^+$, Imagem $_f = \mathbb{R}$.

Figura 21: $D_f = \mathbb{R}^+$, Imagem $_f = \mathbb{R}$.

Funções trigonométricas directas

Funções seno e co-seno

$$f(x) = \text{sen}(x) \quad f(x) = \text{cos}(x)$$

$$D_f = \mathbb{R} \quad \text{Imagem}_f = [-1, 1]$$

(figuras 22, 23, 24, 25)

Figura 22: $D_f = \mathbb{R}$, Imagem $_f = [-1, 1]$.

Figura 23: $D_f = \mathbb{R}$, Imagem $_f = [-1, 1]$.

Figura 24

Figura 25

Função tangente

$$f(x) = \tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\text{cos}(x)}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : x = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Imagem}_f = \mathbb{R}$$

Figura 26

Definem-se ainda as seguintes funções directas:

$$\text{Co-tangente: } \cot(x) = \frac{\text{cos}(x)}{\text{sen}(x)}$$

$$\text{Secante: } \sec(x) = \frac{1}{\text{cos}(x)}$$

$$\text{Co-secante: } \csc(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$$

Funções trigonométricas inversas

As funções trigonométricas não admitem funções inversas, porque não são injectivas. No entanto, considerando apenas intervalos dos domínios nos quais a funções sejam bijectivas, pode obter-se, nesses intervalos, inversas das funções. Apresentam-se a seguir alguns casos.

Função arco seno

$$y = \arcsen(x) \quad \text{ou} \quad y = \text{sen}^{-1}(x)$$

$$D_y = [-1, 1] \quad \text{Imagem}_y = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Figura 27

Função arco co-seno

$$y = \arccos(x) \quad \text{ou} \quad y = \cos^{-1}(x)$$

$$D_y = [-1, 1] \quad \text{Imagem}_y = [0, \pi]$$

Figura 28

Função arco tangente

$$y = \arctan(x) \quad \text{ou} \quad y = \tan^{-1}(x)$$

$$D_y = [-\infty, \infty] \quad \text{Imagem}_y = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

Figura 29

Definem-se ainda as seguintes funções inversas:

Arco co-tangente: $\text{arccot}(x)$

Arco secante: $\text{arcsec}(x)$

Arco co-secante: $\text{arccsc}(x)$

Vídeo . 2.16 (no anexo deste capítulo)

2 Sequências numéricas

2.1 Vizinhança de um número real

Consideremos um número real a e um número real positivo ϵ . A inequação $|x - a| < \epsilon$ é satisfeita pelos valores de x correspondentes ao intervalo aberto centrado em a e de raio igual a ϵ :

$$|x - a| < \epsilon \Leftrightarrow -\epsilon < x - a < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow a - \epsilon < x < a + \epsilon.$$

Um intervalo deste tipo diz-se *vizinhança ϵ do número a* (figura 30).

Figura 30

Exemplo 14. A vizinhança 0.1 do número 2, corresponde ao conjunto de pontos do intervalo $(2 - 0.1, 2 + 0.1) = (1.9, 2.1)$. Uma vizinhança definida por um intervalo aberto, como neste caso, costuma designar-se por *vizinhança aberta* (diz-se *vizinhança fechada*, se o intervalo for fechado).

2.2 Definição de sequência numérica

Uma *sequência* (ou *sucessão*) de números reais é uma fila infinita de números reais separados por vírgulas, gerados segundo uma certa regra. Por exemplo,

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

Cada um dos números designa-se por *termo* da sequência. O termo $1/n$ designa-se por *termo geral* da sequência. Substituindo sucessivamente neste termo a variável n pelos inteiros positivos $1, 2, 3, \dots$, obtêm-se os termos nas posições correspondentes.

Uma sequência numérica representa-se da forma $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou simplesmente (u_n) , e pode ser encarada como uma função de domínio $\mathbb{N}$ e contradomínio $\mathbb{R}$. Pode usar-se qualquer outra letra no lugar de u .

Exemplo 15. Algumas sequências numéricas.

1. $(u_n) = \left(\frac{1}{n^2}\right)$:	$1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{n^2}, \dots$
2. $(v_n) = \left(\frac{1}{2^n}\right)$:	$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$
3. $(w_n) = ((-1)^n)$:	$-1, 1, -1, \dots, (-1)^n, \dots$
4. $(x_n) = (1)$:	$1, 1, 1, \dots, 1, \dots$
5. $(y_n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)$:	$2, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, \dots, 1 + \frac{1}{n}, \dots$
6. $(z_n) = n$:	$2, 1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots$

Uma sequência numérica (u_n) diz-se:

- *limitada*, se existem dois números reais a, b tais que $a \leq u_n \leq b$ para qualquer valor de n , i.e., todos os elementos da sequência pertencem ao intervalo $[a, b]$;
- *limitada superiormente*, se existe um número real b tal que $u_n \leq b$ para qualquer valor de n , i.e., todos os elementos da sequência são inferiores, ou quando muito iguais a b ;
- *limitada inferiormente*, se existe um número real a tal que $a \leq u_n$ para qualquer valor de n , i.e., todos os elementos da sequência são maiores, ou, no mínimo, iguais a a .

Exemplo 16.

1. A sequência

$$(u_n) = \left(\frac{1}{n^2}\right) : 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{n^2}, \dots$$

é limitada, dado que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tem

$$0 \leq \frac{1}{n^2} \leq 1.$$

2. A sequência

$$(u_n) = (2n) : 2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$$

é apenas limitada inferiormente, dado que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tem

$$2 \leq 2n.$$

3. A sequência

$$(u_n) = (-2n) : -2, -4, -6, \dots, -2n, \dots$$

é apenas limitada superiormente, dado que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tem

$$-2n \leq -2.$$

Uma sequência numérica (u_n) diz-se:

- *crescente*, se $u_1 < u_2 < u_3 < \dots < u_n < \dots$;
- *decrecente*, se $u_1 > u_2 > u_3 > \dots > u_n > \dots$;
- *não decrescente*, se $u_1 \leq u_2 \leq u_3 \leq \dots \leq u_n \leq \dots$;
- *não crescente*, se $u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots \geq u_n \geq \dots$;
- *monótona*, se é de algum dos 4 tipos anteriores.

Exemplo 17.

1. A sequência 1 do exemplo 16 é decrescente, dado que $1 > \frac{1}{4} > \frac{1}{9} \dots$.

2. A sequência 2 do exemplo 16 é crescente, dado que $2 < 4 < 6 \dots$.

3. A sequência

$$1, 1, 2, 2, 3, 3, \dots$$

é não decrescente, dado que $1 \leq 1 \leq 2 \leq 2 \leq 3 \leq 3 \dots$

2.3 Limite de uma sequência numérica

Definição 1. Diz-se que uma sequência (u_n) de número reais *converge*, ou *tende*, para o número real L , ou ainda que tem *limite* igual a L , e escreve-se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L,$$

se, e somente se, dado qualquer intervalo centrado em L , $]L - \epsilon, L + \epsilon[$ (figura 31), com $\epsilon > 0$, existe uma ordem n_0 tal que para todos os valores de $n > n_0$, se tem $u_n \in]L - \epsilon, L + \epsilon[$.

Dito de forma equivalente, qualquer intervalo de diâmetro 2ϵ , centrado em L , contém uma quantidade infinita de elementos da sequência (u_n) , ficando fora do intervalo uma quantidade finita de elementos.

$$\begin{array}{ccc} L - \epsilon & L & L + \epsilon \\ \hline \end{array}$$

Figura 31: Intervalo aberto de raio ϵ , centrado em L .

Uma sequência que tem limite diz-se *convergente*. Uma sequência que não tem limite diz-se *divergente*.

Exemplo 18. A sequência de termo geral $u_n = \frac{1}{n}$ tem limite igual a zero quando n tende para infinito, e escreve-se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Por exemplo, se $\epsilon = 0.001$, pode verificar-se que a partir da ordem $n = 1001$, $u_{1001} = 1/1001$, todos os termos seguintes tomam valores pertencentes ao intervalo $(-\epsilon, \epsilon) = (-0.001, 0.001)$, centrado no ponto zero. Existe uma quantidade finita de elementos da sequência fora deste intervalo e uma quantidade infinita de elementos da sequência dentro do intervalo.

Limites infinitos

Dada uma sequência de números reais (u_n) , escreve-se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty, \tag{2.1}$$

se para todo o número k positivo existe uma ordem $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para $n > n_0$, se tem $u_n > k$. Não interessando quão grande seja o valor de k , há uma quantidade finita de termos da sequência que são menores que k e uma quantidade infinita de termos da sequência que são maiores que k (figura 32). De modo análogo se define

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty.$$

Figura 32: Para qualquer $k > 0$, se $u_n \rightarrow +\infty$, então há uma quantidade finita de termos de (u_n) menores que k e uma quantidade infinita de termos da sequência maiores que k .

Exemplo 19. Dada a sequência de termo geral $u_n = 2n$

$$(2n) : 2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$$

se fizermos $k = 1000$ verificamos que a partir do elemento $u_{500} = 2 \times 500 = 1000$, todos os termos da sequência são maiores que k . Existe uma quantidade finita de elementos menores que $k = 1000$ e uma quantidade infinita de elementos maiores que $k = 1000$. Este argumento é válido qualquer que seja o valor $k \in \mathbb{R}^+$ escolhido. Por isso podemos escrever

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty. \quad (2.2)$$

Deve notar-se que não é correcto dizer que (u_n) tem limite infinito, porque o limite quando existe é um número real. Esta sequência *não tem* limite, é uma *sequência divergente*. A expressão (2.2) diz-nos apenas de que forma diverge a sequência.

Vídeos . 2.8 (no anexo deste capítulo)

Alguns teoremas sobre limites de sequências numéricas

Cada um dos teoremas seguintes enuncia um resultado importante sobre limites de sequências numéricas.

O resultado seguinte afirma que o limite de uma sequência numérica (quando existe) é único.

Teorema 1. (unicidade do limite) Se $\lim u_n = a$ e $\lim u_n = b$, então $a = b$.

O resultado seguinte afirma que se uma sequência é convergente, então toda a sequência que se obtém desta considerando apenas uma parte dos seus infinitos elementos, mas não todos, mantendo a ordem entre estes, converge para o mesmo limite.

Teorema 2. Se $\lim u_n = a$, então toda a subsequência de (u_n) converge para a .

O resultado seguinte afirma que se uma sequência é convergente, então todos os seus elementos estão contidos num intervalo da forma $[c, d]$, com $c, d \in \mathbb{R}$.

Teorema 3. Toda a sequência numérica convergente é limitada.

A recíproca do teorema 3 é falsa, i.e., uma sequência numérica pode ser *limitada* e não ter limite. Por exemplo, a sequência $1, 0, 1, 0, \dots$ é limitada, visto que todos os seus termos pertencem ao intervalo $[0, 1]$, mas não tem limite (porquê?).

Teorema 4. Toda a sequência numérica monótona e limitada é convergente.

Vídeo . 2.17 (no anexo deste capítulo)

3 Funções contínuas

3.1 Limite de uma função

Definição 2. Diz-se que uma função real de variável real, $f(x)$, *converge* (ou *tende*) para o número real L , ou ainda que tem *limite* igual a L , quando x tende para a , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

se, e somente se, dada qualquer sequência de valores de x convergente para a

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots \rightarrow a$$

a sequência de imagens por f que lhe corresponde converge para L ,

$$f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots, f(x_n), \dots \rightarrow L.$$

Exemplo 20. A igualdade $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$, significa que quanto mais próximo o valor de x estiver de 4, mais próximo de 2 está o valor de $\sqrt{x}$. Podemos dizer, com significado equivalente, que o valor de $|\sqrt{x} - 2|$ pode ser tão próximo de zero 'quanto se queira', bastando para isso que o valor da diferença $|x - 4|$ seja suficientemente pequeno.

3.1.1 Limites laterais

(ver figura 33, pg. 20)

- *Limite à direita* de $f(x)$ no ponto $x = a$: escreve-se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. É o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow a$ por valores maiores que a .
- *Limite à esquerda* de $f(x)$ no ponto $x = a$: escreve-se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. É o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow a$ por valores menores que a .

Exemplo 21. Na função representada na figura 36, pg. 23, temos

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 5.$$

Teorema 5. O limite de $f(x)$ no ponto $x = a$ existe e é igual a b se, e somente se, existem os dois limites laterais de $f(x)$ no ponto $x = a$ e são ambos iguais a b :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = b.$$

Figura 33: Limites laterais.

O limite de uma função num ponto não depende do valor da função nesse ponto. Para as funções $f(x)$ e $g(x)$ na figura 34, temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b = \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

apesar de a função $g(x)$ não estar definida no ponto $x = a$.

Figura 34

Vídeos . 2.18 a 2.21 (no anexo deste capítulo)

3.1.2 Alguns teoremas sobre limites de funções

Cada um dos teoremas seguintes enuncia um resultado importante sobre limites de funções.

Teorema 6. (unicidade do limite) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$, então $b = c$.

Teorema 7. Sejam $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$ três funções de domínio D e contradomínio $\mathbb{R}$. Se para todo $x \in D$, $x \neq a$, tivermos

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

e

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$$

então

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b.$$

Teorema 8. Sejam $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$. Então,

1. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$;
2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \times M$;
3. Se $M \neq 0$, então $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$.

Exemplo 22. Embora existam os limites $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x) = 1$, não existe o limite $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x) / \sqrt{x}$, porque quando $x \rightarrow 0$ o denominador tende para zero e $1/0$ não é um número.

3.1.3 Limites no infinito

Dada uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b,$$

com $b \in \mathbb{R}$, se para toda a sequência (x_n) de valores de x , tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$,

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots \rightarrow +\infty$$

a sequência de imagens por f que lhe corresponde converge para b ,

$$f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots, f(x_n), \dots \rightarrow b.$$

Exemplo 23. A função $f(x) = 2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ tem limite igual a 2, quando x tende para $+\infty$ (ver figura 35). De facto, se aumentarmos ilimitadamente x , o valor de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ tende para zero.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 2 + 0 = 2.$$

Figura 35: Limites no infinito

3.2 Função contínua

Uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se *contínua* no ponto $x = a$ do seu domínio, se é possível tornar $f(x)$ arbitrariamente próximo de $f(a)$, fazendo x suficientemente próximo de a . A definição seguinte apresenta esta ideia de modo formal.

Definição 3. Uma função $f(x)$ diz-se *contínua* num ponto $x = a$ do seu domínio, se não existe nenhuma sequência de valores da variável x no domínio de $f(x)$, convergente para a ,

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots \rightarrow a$$

à qual corresponda uma sequência de imagens por $f(x)$, que não convirja para $f(a)$,

$$f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots, f(x_n), \dots \not\rightarrow f(a).$$

Observação. Se o ponto a do domínio de f pertence a um intervalo fechado $[b, c]$, contido no domínio de f , então f é contínua em a se e somente se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Definição 4. Uma função $f(x)$ diz-se *contínua num conjunto* D , se e somente se, é contínua em todos os pontos do conjunto D . Se algum ponto do conjunto D é um *ponto de fronteira*, como por exemplo os pontos b, c do intervalo fechado $[b, c]$, ao dizer-se que a função é contínua no intervalo $[b, c]$ está a considerar-se apenas *continuidade lateral* nestes pontos - ver o exemplo 24, em baixo. Dizer-se que uma função é contínua, sem referir nenhum intervalo, significa que a função é contínua em todos os pontos do seu domínio (sendo *lateralmente* contínua nos pontos de fronteira do domínio).

Exemplo 24.

- A função representada na figura 36 é descontínua no ponto $x = 3$, por ter limites laterais diferentes neste ponto. Esta tipo de descontinuidade diz-se de *1ª espécie*. Por ser

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 5 = f(3),$$

diz-se que a função é *contínua à direita* no ponto $x = 3$. No entanto f não é *contínua à esquerda* no ponto $x = 3$, porque $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2 \neq f(3)$.

Figura 36: Função com descontinuidade de 1ª espécie no ponto $x = 3$.

- A função representada na figura 37 é descontínua no ponto $x = 0$, pertencente ao seu domínio. O tipo de descontinuidade que aí apresenta diz-se de *2ª espécie*, porque não existe algum dos limites laterais (neste caso não existe o limite à esquerda no ponto $x = 0$). A função é *contínua à direita* no ponto $x = 0$.

Figura 37: Função com descontinuidade de 2ª espécie no ponto $x = 0$.

Exemplo 25.

- A função representada na figura 38 é contínua, dado ser contínua em todos os pontos do domínio, mas tem uma descontinuidade no ponto $x = 0$. Este ponto diz-se um *ponto de acumulação* do domínio de f (qualquer vizinhança do ponto contém elementos do conjunto, para além do próprio ponto). Em geral, falamos de *continuidade* apenas em pontos do domínio de uma função, mas podemos falar de *descontinuidade* em pontos do domínio da função e nos pontos de acumulação do domínio.

Observação. Da função na figura 39 não dizemos que é descontinua no ponto $x = -2$. A função não está aí definida, tal como a função da figura 38 não está definida no ponto $x = 0$. No entanto, ao contrário do ponto $x = 0$ na figura 38, o ponto $x = -2$ na figura 39 não é ponto de acumulação do domínio da função.

- A função representada na figura 39 é contínua em todos os pontos do seu domínio. O ponto $x = -3$ diz-se *ponto isolado* do domínio da função. Um ponto designa-se por *ponto isolado* de um conjunto, quando existe uma sua vizinhança que não contém mais nenhum elemento do conjunto, excepto o próprio ponto. Deve notar-se que a única sequência numérica com valores no domínio de f convergente para -3 , é a sequência constante $-3, -3, \dots, -3, \dots$. Como a sequência das imagens por f que lhe correspondem é

$$f(-3), f(-3), f(-3), \dots, f(-3), \dots \rightarrow f(-3) = 5,$$

a definição 3 diz-nos que a função f é contínua no ponto $x = -3$.

Figura 38: Descontinuidade assintótica.

Figura 39: Função contínua em todos os pontos do seu domínio $\{-3\} \cup [0, +\infty[$.

Vídeo . 2.22 a 2.25 (no anexo deste capítulo)

3.2.1 Alguns teoremas sobre continuidade

Teorema 9. Se $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua num ponto $a \in D$, então f é limitada numa vizinhança de a ³

Teorema 10. Sejam f, g funções contínuas num ponto $x = a$ comum aos seus domínios. Então:

1. $f(x) \pm g(x)$ e $f(x) \times g(x)$ são funções contínuas em $x = a$;
2. $\frac{f(x)}{g(x)}$ é uma função contínua em $x = a$, se $g(a) \neq 0$.

³Uma função $f(x)$ diz-se *limitada* num intervalo $[b, c]$ do seu domínio, se existem dois números reais, m, M , com $m \leq f(x) \leq M$, para todo $x \in [b, c]$.

Teorema 11. Sejam $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : F \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções, com $f(D) \subset F$. Se f é contínua no ponto $x = a$ e g é contínua no ponto $f(a)$, então $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ é contínua no ponto $x = a$.

Exercício 2. Mostrar que a função $f(x) = e^{-x^2} + \frac{2x-2}{3x+1}$ é contínua em todos os pontos do seu domínio natural.

Solução

O domínio natural da função f é $D = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{3}\}$. A função é contínua em todos os pontos do domínio, porque:

- $-x^2$ e e^x são contínuas em D , porque são contínuas em $\mathbb{R}$ e $D \subseteq \mathbb{R}$. Como e^{-x^2} é a composta destas duas, então é contínua em D , pelo teorema 11;
- $2x - 2$ e $3x + 1$ são contínuas em D . Pelo teorema 10, $\frac{2x-2}{3x+1}$ é também contínua em D .
- Finalmente, pelo teorema 10, como e^{-x^2} e $\frac{2x-2}{3x+1}$ são contínuas em D , então $f(x) = e^{-x^2} + \frac{2x-2}{3x+1}$ é também contínua em D .

Teorema 12. (do valor intermédio para funções contínuas) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua no intervalo $[a, b]$, tal que $f(a) \leq f(b)$. Seja $d \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) \leq d \leq f(b)$. Então existe pelo menos um ponto $c \in [a, b]$, tal que $d = f(c)$.

Exercício 3. (aplicação do teorema 12) Mostrar que o polinómio $f(x) = x^3 - x + 1$ se anula em pelo menos um ponto do intervalo $[-2, 0]$.

Solução

A função $f(x)$ é contínua em $\mathbb{R}$, pelo teorema 10 (todos os polinómios são funções contínuas em $\mathbb{R}$). Como $f(-2) = -5 < 0$ e $f(0) = 1 > 0$, o teorema 12 permite-nos afirmar que existe pelo menos um ponto c no intervalo $[-2, 0]$ tal que $f(c) = 0$, uma vez que $0 \in [-5, 1]$.

Capítulo 3

Derivadas de Funções Reais de Variável Real

Neste capítulo vamos estudar o seguinte. Dada uma função $y = f(x)$, queremos saber quais os valores de x para os quais $f(x)$ se anula (pontos a, c, e, g na figura 40), ou nos quais atinge valores *extremos relativos*, máximos ou mínimos (pontos b, d, f). É importante sabermos também em que intervalos de valores de x a função cresce (intervalo $[b, d]$, por exemplo), em que intervalos a função decresce (intervalo $[d, f]$, por exemplo), e a sua taxa de variação com x nos vários pontos desses intervalos (i.e., com que rapidez varia a função ao longo de cada intervalo). Queremos também conhecer os pontos em que a função é estacionária (pontos a, b, d, f). A representação gráfica pode dar-nos informação importante, mas carece de rigor numérico.

Figura 40

Vamos estudar a operação de *derivação*, que nos vai permitir obter com rigor a informação acima referida. Mais ainda, esta operação vai revelar-se fundamental para resolver problemas de optimização (cálculo de máximos ou mínimos de funções) e para formalizar matematicamente alguns problemas práticos por meio de *equações diferenciais*.

1 Função derivada

Nesta secção vamos definir a *função derivada* $f'(x)$ de uma função real de variável real $f(x)$.

1.1 Taxa de variação média de uma função

Na figura 41 está representada a relação entre a distância d percorrida por um automóvel, em quilómetros, e o tempo t de duração do percurso, em horas, numa viagem que ligou dois pontos que distam entre si 80 quilómetros. Da observação do gráfico, podemos obter a seguinte informação.

- A viagem durou $4h$;
- Na primeira hora de viagem, o automóvel percorreu $25km$;
- Passadas duas horas de viagem, o automóvel tinha percorrido $60km$. Isto significa que o automóvel andou mais depressa na segunda hora de viagem (da hora 1 para

a hora 2) do que na primeira hora, em média, já que nesta segunda hora percorreu 35km , contra os 25km da primeira hora de viagem. O gráfico traduz a maior velocidade na segunda hora, sendo mais íngreme no intervalo $[1, 2]$, de t , do que no intervalo $[0, 1]$;

- Do instante $t = 2$ para o instante $t = 3$, a distância entre o automóvel e o ponto de partida diminuiu para 35km , o que significa que o automóvel voltou para trás.
- Do instante $t = 3$ para o instante $t = 4$, o automóvel retomou o percurso no sentido do ponto de chegada.

Deve notar-se que a forma do gráfico na figura 41, não significa que o carro andou a subir e a descer. O que ela representa é apenas a distância a que o automóvel se encontra do ponto de partida, nos vários momentos da viagem.

Consideremos agora a figura 42. O segmento de recta que une os pontos $(t, d) = (0, 0)$ e $(t, d) = (2, 60)$ representa a distância em função do tempo respeitante a outro automóvel que, partindo no mesmo instante que o automóvel referido no gráfico da figura 41, se encontra no mesmo ponto do trajecto ao fim de 2h de viagem. Designemos por automóvel A o automóvel correspondente ao gráfico não linear e por automóvel B o automóvel correspondente ao gráfico linear.

O facto de o gráfico ser linear para o automóvel B , diz-nos que o veículo efectuou o percurso com um ritmo (velocidade) constante, i.e., percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Recordemos que se um objecto se desloca a uma velocidade constante, o valor da velocidade é dado por

$$\text{velocidade} = \frac{\text{distância percorrida}}{\text{tempo decorrido}}$$

sendo as unidades km/h (quilómetros por hora), se a distância vier expressa em quilómetros e o tempo em horas. Assim, se o velocímetro do nosso carro indica 75km/h , sabemos que se mantivermos esse ritmo percorreremos 75km a cada hora que passa. No caso da figura 42 a velocidade constante v_B a que se desloca o automóvel B é:

$$v_B = \frac{60}{2} = 30\text{km/h}.$$

Esta velocidade é designada por *velocidade média* (ou *taxa de variação média* da distância com o tempo) do automóvel A no intervalo de tempo $[0, 2]$, e representa a velocidade constante a que se deve deslocar um automóvel que, saindo ao mesmo tempo que o automóvel A , estão no mesmo ponto do percurso ao fim de duas horas de viagem. O valor de v_B representa o declive do segmento de recta representado na figura 42. De um modo geral, vale a seguinte definição.

Dada uma função $f(x)$, designa-se por *taxa de variação média* de f com x , no intervalo $[a, b]$, o quociente

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Figura 41: Distância em função do tempo – automóvel A.

o automóvel correspondente ao gráfico

linear.

Figura 42: Distância em função do tempo – automóvel B.

Exemplo 26. Considere-se o gráfico na figura 41.

1. Quais as velocidades médias do automóvel nos intervalos $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[1, 3]$, $[3, 4]$?
2. A que velocidade constante se deve deslocar um automóvel, de modo a começar e a terminar a viagem nos mesmos instantes que o automóvel A ?

Solução

1. A velocidade média referente a um intervalo de tempo com início no instante t_0 e fim no instante t_1 , é dada por $v_{[t_0, t_1]} = \frac{d(t_1) - d(t_0)}{t_1 - t_0}$. Temos então:

$$\begin{aligned} v_{[0,1]} &= \frac{d(1) - d(0)}{1 - 0} = \frac{25 - 0}{1} = 25 \text{ km/h} \\ v_{[1,2]} &= \frac{d(2) - d(1)}{2 - 1} = \frac{60 - 25}{1} = 35 \text{ km/h} \\ v_{[2,3]} &= \frac{d(3) - d(2)}{3 - 2} = \frac{35 - 60}{1} = -25 \text{ km/h} \\ v_{[4,3]} &= \frac{d(4) - d(3)}{4 - 3} = \frac{80 - 35}{1} = 45 \text{ km/h} \end{aligned}$$

Notar que a velocidade média $v_{[2,3]}$ é negativa, porque a distância do veículo ao ponto de partida diminui entre os instantes $t = 2$ e $t = 3$.

2. A velocidade pretendida é a velocidade média do veículo A no intervalo $[0, 4]$.

$$v_{[0,4]} = \frac{d(4) - d(0)}{4 - 0} = \frac{80 - 0}{4} = 20 \text{ km/h.}$$

Um automóvel B que parta ao mesmo tempo que o automóvel A , e que chegue também ao mesmo tempo que o automóvel A ao local de destino, fazendo todo o percurso com velocidade constante, deve deslocar-se à velocidade de 20 km/h .

Vídeos . 2.26 a 2.27 (no anexo deste capítulo)

1.2 Taxa de variação instantânea de uma função. Função derivada

Na figura 42 podemos verificar que o automóvel se desloca mais rapidamente na segunda hora do que na primeira, porque o gráfico aparece mais inclinado no intervalo de tempo $[1, 2]$ do que no intervalo $[0, 1]$.

Na figura 43 representa-se alguns segmentos de recta tangentes ao gráfico. Os declives das tangentes relacionam-se com as velocidades associadas aos pontos de tangência.

A este respeito são válidas as seguintes observações.

-A velocidade é maior numa vizinhança pequena do ponto c , do que em vizinhanças pequenas dos pontos a e b . Isto significa que se no instante a o condutor do automóvel olhar para o velocímetro¹, lê um valor menor que o correspondente ao instante c ;

¹Dispositivo no tablier do carro que indica a velocidade a que este se desloca.

-Para instantes muito próximos dos instantes d e f , o automóvel está praticamente parado. Isto tem sentido porque em ambos os instantes o automóvel tem que parar para inverter a marcha;

- Para instantes próximos de e , a velocidade do automóvel tem sinal negativo (o declive do segmento de recta traçado é negativo). Isto significa que nas proximidades do instante e , o automóvel está a diminuir a distância que o separa do ponto de partida.

O que pretendemos estabelecer a seguir é que, por muito próximos que estejam os dois instantes usados para calcular a velocidade média, o valor obtido para esta pode ser significativamente diferente da velocidade que o automóvel atinge em momentos intermédios a esses dois instantes.

Uma forma de calcularmos a velocidade num instante concreto de tempo, é sugerida pela figura 44. Nela está representado o gráfico de uma função genérica que exprime a distância f em função do tempo x . Fixemos um ponto no eixo das abcissas, x_0 , e calculemos a taxa de variação média da função usando este ponto e um outro ponto, x_1 . Obtemos

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

Este valor representa o declive da recta que une os pontos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_1, f(x_1))$. Consideremos agora esta taxa de variação média usando o ponto fixo x_0 e pontos de uma sequência numérica $x_1, x_2, x_3, \dots$, cada vez mais próximos de x_0 :

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \quad \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}, \quad \frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0}, \quad \dots$$

Estas taxas correspondem aos declives das rectas de uma *sequência de retas*, conforme mostra a figura. Podemos perguntar o seguinte: se esta sequência de números $x_1, x_2, x_3, \dots$ usados para calcular as variações médias, convergir para o ponto que mantemos fixo, x_0 , a sequência de rectas correspondentes converge para alguma “recta limite”, cujo declive é dado por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} ?$$

Se este limite existir, o seu valor diz-se *derivada* da função $f(x)$ no ponto x_0 e representa o declive da *recta tangente* à curva no ponto x_0 (a recta r , na figura 44). Escreve-se

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (3.1)$$

Registamos esta noção importante.

Dada uma função $f(x)$ e um ponto x_0 do seu domínio, a *derivada da função no ponto x_0* , que se escreve $f'(x_0)$, se existir, representa o declive da recta tangente ao gráfico da função $f(x)$ no ponto x_0 .

$f'(x_0)$ designa-se por *taxa de variação instantânea* da função $f(x)$ no ponto x_0 .

Figura 44: A recta r é a ‘recta limite’ de uma sucessão de rectas definidas pelo ponto x_0 , e por cada um dos pontos da sequência $x_1, x_2, x_3, \dots \rightarrow x_0$.

Vídeos . 2.28 a 2.30 (no anexo deste capítulo)

Exercício 4. Calcular a derivada da função $f(x) = x^2$ no ponto $x = 2$.

Resolução

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2^2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4.$$

Sabemos que $m = f'(2) = 4$ é o declive da recta tangente ao gráfico de $f(x)$ no ponto $x = 2$. Podemos determinar a equação desta recta, sabendo que ela contém o ponto $(x, y) = (2, f(2)) = (2, 4)$. Obtemos (figura 45)

$$y = 4x + b$$

$$\text{Cálculo de } b: 4 = 4 \times 2 + b \Leftrightarrow b = -4$$

$$\text{Equação da recta: } y = 4x - 4$$

Exercício 5. Calcular a derivada da função $f(x) = x^3$ no ponto $x = 0$.

Resolução

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 0^3}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

Sabemos que $m = f'(0) = 0$ é o declive da recta tangente ao gráfico de $f(x)$ no ponto $x = 0$. Podemos determinar a equação desta recta, sabendo que ela contém o ponto $(x, y) = (0, f(0)) = (0, 0)$. Obtemos (figura 46)

$$y = 0x + b = b$$

$$\text{Cálculo de } b: 0 = 0 \times 0 + b \Leftrightarrow b = 0$$

$$\text{Equação da recta: } y = 0 \text{ (a recta coincide com o eixo das abcissas)}$$

Figura 45

Figura 46

Torna-se mais cómodo calcular a derivada de um função num ponto, se dermos outra forma à fórmula (3.1). Fazendo $h = x - x_0$ temos $x = x_0 + h$ e podemos escrever a fórmula (3.1) na forma

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (3.2)$$

Exemplo 27. Usando a fórmula 3.2 para calcular a derivada de $f(x) = x^2$ no ponto $x = 2$ (ver o exercício 4, pg. 30), temos

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^2 + 2 \times 2h + h^2 - 2^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times 2h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2 \times 2 + h) = 4. \end{aligned}$$

É imediato verificar que, se quisermos calcular a derivada de $f(x) = x^2$ noutro ponto diferente de $x = 2$, por exemplo no ponto $x = 3$, basta repetir os cálculos efectuados no exercício 27, usando $x = 3$:

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3^2 + 2 \times 3h + h^2 - 3^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times 3h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2 \times 3 + h) = 6. \end{aligned}$$

Podemos obter uma função $f'(x)$ que nos permita calcular o valor da derivada em qualquer ponto sem repetir os cálculos acima. Basta efectuá-los uma só vez, trocando o ponto 3 pelo ponto genérico x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

A função $f'(x) = 2x$ diz-se *função derivada* de $f(x) = x^2$. É agora imediato obter o valor da derivada de $f(x) = x^2$ em qualquer ponto. Por exemplo:

$$f'(2) = 2 \times 2 = 4 \quad f'(-3) = 2 \times (-3) = -6.$$

A interpretação da função $f'(x) = 2x$ obtida acima é a seguinte (figura 45):

- Para valores de $x < 0$ a expressão $2x$ é negativa. Isto significa que, para valores negativos de x , a função $f(x) = x^2$ é *decrecente* e decresce de forma tão mais acentuada quanto menor for o valor de x ;
- Para valores de $x > 0$ a expressão $2x$ é positiva. Isto significa que, para valores positivos de x , a função $f(x) = x^2$ é *crecente* e cresce de forma tão mais acentuada quanto maior for o valor de x ;
- Para $x = 0$ obtemos $f'(0) = 0$. Dizemos que a função $f(x) = x^2$ é *estacionária* no ponto $x = 0$.

Em resumo, podemos dizer o seguinte.

Dada uma função $f(x)$, a expressão $f'(x)$ representa uma nova função de x , cujo domínio é o conjunto de todos os pontos em que a função $f(x)$ tem derivada. Atribuindo a x diferentes valores $x_1, x_2, \dots$, obtêm-se para $f'(x)$ determinados valores, $f'(x_1), f'(x_2), \dots$, que são as *derivadas* de $f(x)$ nesses pontos. A função $f'(x)$ diz-se *função derivada* de $f(x)$, ou simplesmente *derivada* de $f(x)$, e pode também ser representada pelas notação

$$\frac{df}{dx}.$$

A derivada de $y = f(x)$ num ponto concreto x_0 escreve-se, em geral, de alguma das formas

$$y'|_{x=x_0}, \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=x_0}, \quad f'(x_0), \quad \frac{df(x_0)}{dx}.$$

Exercício 6. Considerar a função $f(x) = \sqrt{x}$. Calcular a função derivada $f'(x)$.

Resolução

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \quad (\text{porquê?}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \quad (\text{porquê?}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Exercício 7. Justificar que não existe a derivada da função $f(x) = \frac{1}{x}$ no ponto $x = 0$.

Vídeos . 2.31 a 2.37 (no anexo deste capítulo)

1.3 Derivadas laterais

O limite na fórmula 3.2 pode não existir (o que significa que a função $f'(x)$ não está definida no ponto x_0) mas, apesar disso, existir algum dos limites laterais

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad (3.3)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}. \quad (3.4)$$

Cada um destes limites designa-se por *derivada lateral* de $f(x)$ no ponto x_0 , sendo o primeiro a derivada lateral de $f(x)$ à *direita*, no ponto x_0 , que se escreve $f'_+(x_0)$, e o outro a derivada lateral de $f(x)$ à *esquerda* no ponto x_0 , que se escreve $f'_-(x_0)$. Uma função é derivável num ponto x_0 se, e somente se, existem e são iguais nesse ponto as suas derivadas laterais.

Exemplo 28. A função representada na figura 47 não tem derivada no ponto $x = 1$, porque as derivadas laterais no ponto são distintas.

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1-1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{h} = 0$$

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

Exemplo 29. A função representada na figura 48 não tem derivada no ponto $x = 2$, porque não está definida nesse ponto.

Figura 47

Figura 48

Figura 49

De um modo geral, podemos dizer o seguinte.

Se uma função $f(x)$ é derivável no ponto x_0 , então ela é 'lisa' nesse ponto, i.e., o ponto x_0 não é um ponto *angular* (o ponto $x=1$ na figura 47 é um ponto angular) ou um ponto *cuspidal* (o ponto $x=0$ na figura 49 é um ponto cuspidal).

Vídeo . 2.38 (no anexo deste capítulo)

2 Derivadas de algumas funções elementares. Regras de derivação

Vamos agora determinar as derivadas de algumas funções elementares e apresentar algumas regras de derivação que nos permitem calcular a função derivada de uma soma ou de um produto de funções, bem como de uma divisão de funções, de uma composição de funções e da

inversa de uma função. Na posse deste conhecimento, podemos determinar facilmente a derivada de um grande número de funções.

2.1 Derivadas de algumas funções elementares

Funções constantes

$$\begin{aligned} f(x) &= k, \quad k \in \mathbb{R}. \\ f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \end{aligned}$$

Como se pode verificar, a derivada dum função constante é nula em qualquer ponto do seu domínio.

Exemplo 30.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} & f'(x) &= \left(\frac{1}{2}\right)' = 0 \\ f(x) &= \log_{10} 12 & f'(x) &= (\log_{10} 12)' = 0 \\ f(x) &= e^{-2} & f'(x) &= (e^{-2})' = 0 \end{aligned}$$

Funções potência

$$\begin{aligned} f(x) &= x^r, \quad r \in \mathbb{R} \\ f'(x) &= r x^{r-1} \end{aligned}$$

Exemplo 31. Dedução da fórmula da derivada de $f(x) = x^n$, sendo n um número inteiro positivo. Sabemos que

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k = x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} h + \binom{n}{2} x^{n-2} h^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x h^{n-1} + h^n,$$

com

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Podemos escrever

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\binom{n}{1} x^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} h + \binom{n}{3} x^{n-3} h^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x h^{n-2} + h^{n-1} \right) \\ &= \binom{n}{1} x^{n-1} = n x^{n-1} \end{aligned}$$

Exemplo 32.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[5]{x} & f'(x) &= \left(x^{\frac{1}{5}}\right)' = \frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}-1} = \frac{1}{5}x^{-\frac{4}{5}} \\ f(x) &= x^{-4} & f'(x) &= \left(x^{-4}\right)' = -4x^{-4-1} = -4x^{-5} \\ f(x) &= x^4 & f'(x) &= \left(x^4\right)' = 4x^{4-1} = 4x^3 \end{aligned}$$

Funções exponenciais

$$\begin{aligned} f(x) &= a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1 \\ f'(x) &= a^x \ln a \end{aligned}$$

Prova.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} a^x \frac{a^h - 1}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \end{aligned}$$

Vamos calcular o limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$. Designando $a^h - 1$ por t , temos

$$a^h - 1 = t \Leftrightarrow a^h = 1 + t \Leftrightarrow h = \log_a(1 + t).$$

Podemos escrever, notando que se $h \rightarrow 0$ também $t \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1 + t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\log_a \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{\frac{1}{t}}} \\ &= \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{\frac{1}{t}}} = \frac{1}{\log_a e} = \ln a \end{aligned}$$

□

Notar que se $a = e$ ($e \approx 2.718$ é a constante de Euler) temos,

$$(e^x)' = e^x \ln e = e^x,$$

o que mostra que a fórmula para a derivada duma exponencial de base a é *mais simples* quando se tem $a = e$.

Exemplo 33.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2^x & f'(x) &= (2^x)' = 2^x \ln 2 \\ f(x) &= 0.34^x & f'(x) &= (0.34^x)' = 0.34^x \ln 0.34 \\ f(x) &= (\sqrt{7})^x & f'(x) &= ((\sqrt{7})^x)' = (\sqrt{7})^x \ln \sqrt{7} \end{aligned}$$

Sabendo que $0.34^x > 0$ (porquê?) e que $\ln 0.34 < 0$ (porquê?), temos $(0.34^x)' < 0$, para qualquer valor de x . Isto significa que a função $f(x) = 0.34^x$ é decrescente em todo o seu domínio.

Funções logarítmicas

$$f(x) = \log_a |x|, \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$$

Prova.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a |x+h| - \log_a |x|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_a \left| 1 + \frac{h}{x} \right|.$$

Notar que $\log_a |x+h| - \log_a |x| = \log_a \left| \frac{x+h}{x} \right| = \log_a \left| 1 + \frac{h}{x} \right|$. Temos então

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left| 1 + \frac{h}{x} \right|^{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left| 1 + \frac{h}{x} \right|^{\frac{x}{hx}} = \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left(\left| 1 + \frac{h}{x} \right|^{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \log_a \left(\lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{1}{x}} = \log_a e^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a} \end{aligned}$$

□

Notar que se $a = e$ temos,

$$(\log_e |x|)' = \frac{1}{x \ln e} = \frac{1}{x},$$

o que mostra que a fórmula para a derivada dum logaritmo de base a é *mais simples* quando se tem $a = e$.

Exemplo 34.

$$\begin{aligned} f(x) &= \log_{10} |x| & f'(x) &= (\log_{10} |x|)' = \frac{1}{x \ln(10)} \\ f(x) &= \log_{0.34} |x| & f'(x) &= (\log_{0.34} |x|)' = \frac{1}{x \ln(0.34)} \\ f(x) &= \ln(x) & f'(x) &= (\ln(x))' = \frac{1}{x}, \quad x > 0 \end{aligned}$$

Funções trigonométricas directas

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{sen}(x) & f'(x) &= \text{cos}(x) \\ f(x) &= \text{cos}(x) & f'(x) &= -\text{sen}(x) \end{aligned}$$

Prova. Dedução da fórmula da derivada da função $\text{sen}(x)$.

Vamos usar a fórmula $\operatorname{sen}(p) - \operatorname{sen}(q) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{p-q}{2}\right)\operatorname{cos}\left(\frac{p+q}{2}\right)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen}(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\operatorname{sen}\left(\frac{h}{2}\right)\operatorname{cos}\left(\frac{2x+h}{2}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} \lim_{h \rightarrow 0} \operatorname{cos}\left(\frac{2x+h}{2}\right) \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = 1$$

e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \operatorname{cos}\left(\frac{2x+h}{2}\right) = \operatorname{cos}\left(\frac{2x}{2}\right) = \operatorname{cos}(x),$$

temos

$$f'(x) = \operatorname{cos}(x)$$

□

Notar que as igualdades $(\operatorname{sen}(x))' = \operatorname{cos}(x)$ e $(\operatorname{cos}(x))' = -\operatorname{sen}(x)$ são válidas se o ângulo x vier em *radianos*.

Vídeo . 2.39 (no anexo deste capítulo)

2.2 Derivadas de somas, produtos e divisões de funções

Teorema 13. Sejam $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções deriváveis no ponto genérico x . Valem as seguintes regras de derivação.

1. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$
2. $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}, \quad g(x) \neq 0.$

Prova.

1. Prova-se a regra da derivada de uma adição de funções. A prova para o caso da subtração é análoga.

$$\begin{aligned} (f+g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) + g(x+h)) - (f(x) + g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x)) + (g(x+h) - g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 (fg)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) \\
 &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 (f/g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)/g(x+h) - f(x)/g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x) - f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}}{g(x+h)g(x)} \\
 &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}
 \end{aligned}$$

□

Vídeos . 2.40 a 2.43 (no anexo deste capítulo)

Exemplo 35.

$$f(x) = 3x - 2e^x \quad f'(x) = (3x - 2e^x)' = (3x)' - (2e^x)' = 3 - ((2)'e^x + 2(e^x)') = 3 - 2e^x$$

$$f(x) = x \operatorname{sen}(x) \quad f'(x) = (x \operatorname{sen}(x))' = (x)' \operatorname{sen}(x) + x(\operatorname{sen}(x))' = \operatorname{sen}(x) + x \cos(x)$$

$$f(x) = \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} \quad f'(x) = \left(\frac{x}{\operatorname{sen}(x)} \right)' = \frac{(x)' \operatorname{sen}(x) - x(\operatorname{sen}(x))'}{\operatorname{sen}^2(x)} = \frac{\operatorname{sen}(x) - x \cos(x)}{\operatorname{sen}^2(x)}$$

Exercício 8. Usando as fórmulas para as derivadas de $\operatorname{sen}(x)$ e $\cos(x)$, obter as derivadas das funções trigonométricas seguintes.

$$f(x) = \tan(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$$

$$f(x) = \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$$

$$f(x) = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$f(x) = \csc(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)}$$

2.3 Derivada da função composta

Teorema 14. Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções, com $f(A) \subset B$ e $a \in A$, tal que $b = f(a)$ (ver figura 50). Se existem $f'(a)$ e $g'(b)$, então $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável em $x = a$ e tem-se

$$(g \circ f)'(a) = f'(a)g'(b) = f'(a)g'(f(a)). \quad (3.5)$$

Se na fórmula (3.5) substituirmos a por um ponto genérico x , obtemos a fórmula

$$(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x)).$$

A expressão $g'(f(x))$ determina-se em dois passos: (i) Calcula-se primeiro $g'(x)$ e substitui-se nesta expressão a variável x por $f(x)$; (ii) multiplica-se a expressão obtida por $f'(x)$. Pode indicar-se das formas

$$(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x))$$

ou

$$(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(u)|_{u=f(x)}.$$

A fórmula para a derivada da função composta, também se designa por *regra da cadeia*.

Figura 50

Vídeo . 2.44 (no anexo deste capítulo)

Exercício 9. Sejam $f = x^2$ e $g = e^x$ duas funções. Determinar

1. $(g \circ f)(x)$
2. $(g \circ f)'(x)$
3. $(g \circ f)'(-2)$.

Resolução

1. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = e^{x^2}$.
2. $(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x)) = (x^2)'(e^u)'|_{u=x^2} = 2xe^{x^2}$.
3. $(g \circ f)'(-2) = 2(-2)e^{(-2)^2} = -4e^4$.

2.4 Derivada da função inversa

Na figura 51 está representada uma recta de declive $m = 2$. Trocando o papel dos eixos do referencial, i.e., considerando como eixo dos xx o eixo dos yy e como eixo dos yy o eixo dos xx , a mesma recta fica, neste novo referencial, com o declive $m = \frac{1}{2}$. Consideremos agora a figura 52.

1. A função $f(x) = x^2$ aí representada é bijectiva no intervalo $[0, +\infty[$.
2. Admite, por isso, uma função inversa, na restrição $[0, +\infty[$ do seu domínio. Podemos ler do gráfico que, por exemplo, $f(2) = 4$ e por isso $f^{-1}(4) = 2$.
3. A recta tangente ao gráfico no ponto de abscissa $x = 2$, cuja equação é $y = 4x - 4$, tem declive $m = 4$. Isto significa que $f'(2) = 4$.
4. Como o gráfico de f^{-1} se obtém do gráfico de f trocando os papéis dos eixos do referencial, podemos afirmar que o valor da derivada de f^{-1} no ponto $x = 4$ é $m = \frac{1}{4}$, i.e.,

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(2)}.$$

Podemos generalizar este resultado da seguinte forma.

Teorema 15. Seja f uma função invertível numa vizinhança do ponto $x = a$ e derivável nesse ponto. Então, a derivada da função inversa f^{-1} no ponto $b = f(a)$ é dada por

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Figura 51

Figura 52: $f(x) = x^2$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$.

Vídeo . 2.45 (no anexo deste capítulo)

Exercício 10. Calcular a derivada da função $f^{-1}(x)$, sendo $f(x) = e^x$.

Resolução

Se $x = a$ é um ponto genérico do domínio de $f(x) = e^x$, então a sua imagem por f é e^a . Pelo teorema 15, podemos escrever

$$(f^{-1})'(e^a) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{e^a}. \quad (3.6)$$

Sabemos que a função inversa de $f(x) = e^x$ é

$$f^{-1}(x) = \ln(x)$$

e por isso

$$(f^{-1}(x))' = (\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

, pelo que podemos escrever

$$(\ln(x))' |_{x=e^a} = \frac{1}{e^a},$$

em concordância com o resultado que figura na expressão (3.6).

3 Teoremas relativos a funções deriváveis

O resultado seguinte diz-nos que uma função derivável num ponto é contínua nesse ponto.

Teorema 16. Se existe $f'(a)$, então f é contínua no ponto $x = a$.

A afirmação recíproca deste teorema é falsa, i.e., uma função pode ser contínua num ponto e não ser aí derivável. Por exemplo, a função representada na figura 53 é contínua no ponto $x = 1$, apesar de não ter derivada neste ponto, por serem aí diferentes as derivadas laterais.

Figura 53

$$\begin{aligned} f'_-(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-1}{h} = 0 \\ f'_+(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1+h-1}{h} = 1 \end{aligned}$$

O teorema seguinte permite-nos localizar zeros da função derivada (figura 54).

Teorema 17. (de Rolle) Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e derivável no intervalo (a, b) , tal que $f(a) = f(b)$. Então, existe um ponto $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

Figura 54

4 Derivadas de ordem superior

Até agora falámos de derivadas de *primeira ordem*. Dada um função $f(x)$ vimos que a sua derivada se pode representar por qualquer uma das formas

$$f'(x), \quad \text{ou} \quad \frac{df(x)}{dx}, \quad \text{ou} \quad \frac{d}{dx}f(x).$$

Exemplo 36.

$$\begin{aligned}(x^4)' &= 4x^3 \\ \frac{d}{dx}x^4 &= 4x^3 \\ \frac{d}{dx}\text{sen}(x) &= \text{cos}(x) \\ \frac{d}{dx}\ln(x) &= \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

Se derivarmos agora a função $f'(x)$ obtemos a derivada de *segunda ordem* de $f(x)$, que se representa, em geral, por qualquer uma das formas

$$f''(x), \quad \text{ou} \quad \frac{d^2 f(x)}{dx^2}, \quad \text{ou} \quad \frac{d^2}{dx^2}f(x)$$

sendo

$$f''(x) = (f'(x))' \quad \text{e} \quad \frac{d^2}{dx^2}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{d}{dx}f(x)\right).$$

Exemplo 37.

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dx^2}x^4 &= \frac{d}{dx}(4x^3) = 12x^2 \\ \frac{d^2}{dx^2}\text{sen}(x) &= \frac{d}{dx}\text{cos}(x) = -\text{sen}(x) \\ \frac{d^2}{dx^2}\ln(x) &= \frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}\end{aligned}$$

Este conceito de derivação sucessiva estende-se a qualquer ordem de derivação, podendo falar-se de *derivada de ordem três*, ou *terceira derivada*, *derivada de ordem quatro*, ou *quarta derivada*, ..., *derivada de ordem n*, ou *derivada n-ésima* de uma função $f(x)$. Quando se usa a notação com linhas, f' , f'' , ..., é costume, se a ordem de derivação é maior que 3, usar notação romana em vez das linhas, ou colocar entre parênteses curvos a ordem da derivada em notação árabe.

Exemplo 38.

$$\begin{aligned}f^{iv} \text{ ou } f^{(4)} &\text{ para a quarta derivada} \\ f^v \text{ ou } f^{(5)} &\text{ para a quinta derivada} \\ \text{etc.}\end{aligned}$$

Da mesma forma que a primeira derivada nos dá informação sobre a variação de f , a segunda derivada f'' dá-nos informação sobre a variação de f' , a terceira derivada dá-nos informação sobre a variação de f'' , etc.

5 Derivada da função implícita

Uma função diz-se representada na *forma implícita*, se a fórmula que a representa não tem a *forma explícita* de uma equação resolvida em ordem a y , i.e., $y = f(x)$.

Exemplo 39.

$y = 3x + 2$	forma explícita da equação de uma recta
$y - 3x = 2$	uma forma implícita da equação da mesma recta
$y - 3x - 2 = 0$	outra forma implícita da equação da mesma recta

Exemplo 40.

$y = x^2 - 3x + 2$	forma explícita de uma função quadrática
$2 - y = 3x - x^2$	uma forma implícita da função anterior

Exemplo 41. A equação $y^2 = 3x - 1$ representa implicitamente as duas funções

$$y = \pm\sqrt{3x - 1}.$$

A forma geral das funções implícitas é $F(x, y) = 0$, sendo o primeiro membro uma expressão que envolve a variáveis x e y .

Na prática deparamo-nos, em alguns casos, com funções na forma implícita, podendo não ser fácil, ou ser mesmo impossível, escrevê-las na forma explícita. Apesar disto é possível, em certas situações, obter a derivada y' da função assim representada sem ser necessário obter previamente a sua forma explícita.

Exercício 11. Calcular a derivada y' da função implícita $y - 2x = 3$, sem escrever previamente a equação da função na forma explícita.

Resolução

Se temos duas funções *equivalentes*², $f(x) = g(x)$, podemos escrever

$$f(x) = g(x) \Rightarrow f'(x) = g'(x).$$

Como a expressão $y - 2x = 3$ exprime a equivalência das funções $y - 2x$ e 3, podemos escrever

$$(y - 2x)' = (3)' \Rightarrow y' - 2 = 0 \Rightarrow y' = 2.$$

O resultado obtido para y' é o mesmo que se obtém resolvendo previamente a equação em ordem a y .

Exercício 12. Obter a equação da recta tangente à circunferência $x^2 + y^2 = 4$, no ponto $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ (ver figura 55).

Resolução

A circunferência tem centro na origem $(0, 0)$ do referencial e raio igual a 2. Começamos por verificar que o ponto $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ é um ponto da circunferência, substituindo estas coordenadas na equação e mostrando que a igualdade é verificada.

$$(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4 \Leftrightarrow 2 + 2 = 4.$$

Para obter a recta procurada, $y = mx + b$, precisamos de calcular o valor de y' no ponto $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, que representa o declive da recta. Para isso derivamos a função implícita $x^2 + y^2 = 4$ para obter y' .

$$(x^2 + y^2)' = (4)' \Rightarrow 2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}.$$

²Duas funções dizem-se equivalentes se têm o mesmo domínio, e se tomam valores iguais em cada ponto do domínio.

O valor de y' no ponto $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ é $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -1$. Ficamos a saber que a equação da recta tangente é da forma $y = -x + b$. Resta-nos calcular o valor de b . Como a recta contém o ponto $(x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$, temos

$$\sqrt{2} = -\sqrt{2} + b \Leftrightarrow b = 2\sqrt{2}.$$

A equação da recta tangente procurada é $y = -x + 2\sqrt{2}$.

Figura 55

Figura 56

Exercício 13. Obter a equação da recta tangente ao gráfico que representa a equação $y^2 = x^4$, no ponto $(x, y) = (-1, -1)$ (ver figura 56).

Resolução

A equação $y^2 = x^4$ representa duas funções, $y = \pm x^2$. Vamos obter as derivadas das funções representadas implicitamente por esta equação.

$$(y^2)' = (x^4)' \Rightarrow 2yy' = 4x^3 \Rightarrow y' = \frac{2x^3}{y}.$$

Para obter a recta procurada, $y = mx + b$, precisamos de calcular o valor de y' no ponto $(x, y) = (-1, -1)$.

$$m = \frac{2(-1)^3}{-1} = 2.$$

Ficamos a saber que a equação da recta tangente é da forma $y = 2x + b$. Resta-nos calcular o valor de b . Como a recta contém o ponto $(x, y) = (-1, -1)$, temos

$$-1 = -2 + b \Leftrightarrow b = 1.$$

A equação da recta tangente procurada é $y = 2x + 1$.

Anexo: Vídeos

Função, Domínio, Imagem, Contradomínio, Gráfico

2.1

Ideia de função
[06:25]

2.6

Gráfico: seno
[12:37]

2.2

Gráfico de uma
função [07:38]

2.7

Contradomínio
[08:00]

2.3

Gráfico: raiz qua-
drada [10:12]

2.4

Gráfico: exponen-
cial [04:48]

2.5

Gráfico: logaritmo
[05:51]

Operações com Funções, Função Composta, Função Inversa, Funções Elementares

2.8

Operações com
Funções [13:33]

2.9

Função Com-
posta, 1 [05:10]

2.10

Função Com-
posta, 2 [05:50]

2.11

Função Com-
posta, exercício
[10:09]

2.12

Função Inversa
[09:01]

2.13

Função inversa:
exponencial
[10:24]

2.14

Função inversa:
quadrática [06:50]

2.15

Composta de
Funções Inversas
[03:57]

2.16

Funções Elemen-
tares [05:53]

Limite de uma Função num Ponto, Funções Contínuas

2.17

Constante de Ne-
per [02:10]

2.18

Limite de uma
função num ponto
- 1 [07:12]

2.19

Limite de uma
função num ponto
- 2 [06:58]

2.20

Exercício [01:01]

2.21

Exercício [05:11]

2.22

Continuidade de
uma função num
ponto [03:12]

2.23

Exercício [02:45]

2.24

Exercício [08:47]

2.25

Importância da
continuidade
na relação out-
put/input de
sistemas físicos
[03.36]

Derivadas: taxa de variação média e instantânea; velocidade média e instantânea; interpretação gráfica

2.26

Taxa de variação
média [07.07]

2.27

Velocidade média
[03:59]

2.28

Taxa de varia-
ção instantânea
[06:21]

2.29

Derivada de uma
função num ponto
[06:28]

2.30

Derivada = veloci-
dade [03:23]

2.31

Velocidade instan-
tânea [06:35]

2.32

Derivada num
ponto: interpreta-
ção gráfica [06:03]

2.33

f' é o velocímetro
de f [09:22]

Derivadas de algumas funções; declive da recta tangente ao gráfico num ponto

2.34

Derivada da pará-
bola [07:40]

2.35

Derivada da raiz
quadrada [06:17]

2.36

Derivada: notação
e unidades [04:42]

2.37

Derivada num
ponto=declive da
recta tangente
[02:41]

2.38

Curva suave [2.27]

Derivadas de algumas funções elementares; regras de derivação

2.39

Derivadas de fun-
ções elementares
[07:59]

2.40

Derivação de so-
mas, produtos e
cocientes [02:17]

2.41

Derivação da
soma: prova
[02:11]

2.42

Derivação do pro-
duto: prova [05:03]

2.43

Derivação do coci-
ente: prova [04:35]

Derivada da função composta; derivada da função inversa

2.44

Derivada da função composta
[05:29]

2.45

Derivada da função inversa [12:20]