Resolução do exame de Análise Matemática I (24/1/2003)
Cursos: CA, GE, GEI, IG

1ª Chamada

Exercício 1

$$2^x > 3^x \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x > 1 \text{ como } \left(\frac{2}{3}\right)^x \text{ é}$$

uma função exponencial de base menor do que 1 então o gráfico desta função é o representado na figura ao lado.

Esta função é estritamente decrescente e em 0 vale 1, pelo que

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x > 1 \Leftrightarrow x \in]-\infty, 0[= \mathbb{R}^-.$$

Resposta (ii).

Exercício 2

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} \stackrel{(\infty)}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \ln(\cos x)\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(\cos x)}{x}\right)}$$

$$\text{Como } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(\cos x)}{x}\right) \stackrel{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-\text{sen}(x)}{\cos(x)}\right) = 0 \text{ (pela regra de L'Hôpital). Logo}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

Resposta (ii).

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x-1}} \stackrel{(\infty^0)}{=} e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x-1} \ln(x)\right)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x-1}\right)}$$

$$\text{Como } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x-1}\right) \stackrel{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1/x}{1}\right) = \frac{1}{\infty} = 0 \text{ (pela regra de L'Hôpital). Logo}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x-1}} = e^0 = 1$$

Resposta (ii).

Exercício 3

- $f(x) = x \cos(x)$

A recta tangente é dada por $y - y_0 = m(x - x_0)$, onde

- $x_0 = \pi$

- $y_0 = f(x_0) = \pi \cos(\pi) = -\pi$

- $m = f'(\pi)$: $f'(x) = \cos(x) - x \operatorname{sen}(x)$, logo $f'(\pi) = \cos(\pi) - \pi \operatorname{sen}(\pi) = -1$

Logo a recta tem equação $y + \pi = -1(x - \pi) \Leftrightarrow y = -x$

Resposta (iv).

- $f(x) = (x+1)e^{-x^2}$

A recta tangente é dada por $y - y_0 = m(x - x_0)$, onde

- $x_0 = 0$

- $y_0 = f(x_0) = e^0 = 1$

- $m = f'(0)$: $f'(x) = e^{-x^2} - 2x(x+1)e^{-x^2} = e^{-x^2}(1 - 2x - 2x^2)$, logo

$$f'(0) = e^0 = 1$$

Logo a recta tem equação $y - 1 = 1(x - 0) \Leftrightarrow y = x + 1$

Resposta (iv).

Exercício 4

A função f é contínua e está definida num intervalo fechado, logo está nas condições dos teoremas de Bolzano e de Weierstrass.

Pelo teorema de Weierstrass f tem máximo e mínimo, logo como (ii) – não tem mínimo e (iii) – não tem máximo, ficam excluídas.

Pelo teorema de Bolzano exclui-se (i) porque se 3 e 2 forem imagens por f todos os valores entre 2 e 3 seriam imagem por f (e nesse caso o contradomínio teria de ser $[1, 3]$).

Resposta (iv).

Exercício 5

_ Para $x \in]-\infty, 0[$ o gráfico tem concavidade voltada para cima, logo no intervalo $]-\infty, 0[$ $f''(x)$ tem sinal positivo.

_ De acordo com o gráfico, f não está definida em 0, logo $f''(0)$ não está definida.

_ Para $x \in]0, 3[$ o gráfico tem concavidade voltada para baixo, logo no intervalo $]0, 3[$ $f''(x)$ tem sinal negativo.

_ De acordo com o gráfico, $f(3)$ é um ponto “anguloso” – o gráfico faz um “bico” em $x=3$, logo não existe $f''(3)$ (a derivada lateral à esquerda é positiva enquanto que a derivada lateral à direita é negativa logo f não é derivável em 3 pelo que também não tem 2ª derivada em 3).

_ Para $x \in]3, +\infty[$ o gráfico tem concavidade voltada para cima, logo no intervalo $]3, +\infty[$ $f''(x)$ tem sinal positivo.

Resposta (iii)

x		0		3	
Sinal de f''	+	não definida	-	não definida	+

Exercício 6

_ Pelo gráfico temos que f é decrescente em $]-\infty, 0[$ logo f' é negativa em $]-\infty, 0[$, logo (i) e (iv) ficam excluídas;

_ Pelo gráfico temos que f é crescente em $]0, +\infty[$ logo f' é positiva em $]0, +\infty[$, logo (iii) fica excluída;

Resposta (ii).

Exercício 7

- $\int \frac{x \arcsen(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ fazendo $t = \arcsen(x)$ temos $dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ e como

$$t = \arcsen(x) \Leftrightarrow \text{sen}(t) = x, \text{ então o integral } \int \frac{x \arcsen(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int x \arcsen(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \text{ é}$$

equivalente a $\int t \text{sen}(t) dt$.

Resposta (ii).

- $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^{2x}}} dx$ fazendo $t = e^{2x}$ temos $dt = 2e^{2x} dx$ e como $dt = 2e^{2x} dx \Leftrightarrow \frac{1}{2} dt = e^{2x} dx$,

então o integral $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^{2x}}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} e^{2x} dx$ é equivalente a $\int \frac{1}{2\sqrt{1+t}} dt$.

Resposta (i).

Exercício 8

$$\int \frac{2}{x^2 + 2x + 2} dx = 2 \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx \stackrel{\text{form.16}}{=} 2 \operatorname{arctg}(x+1) + C, \text{ com } C \in \mathbb{R}.$$

Alternativamente, uma vez que $x^2 + 2x + 2$ não tem raízes trata-se da primitiva de uma função racional do “Tipo III” logo tal primitiva envolve a função $\operatorname{arctg}(x)$.

Resposta (iii).

Exercício 9

9.1) $D_f = \{x \in \mathbb{R} : x+1 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

9.2) Vamos determinar uma assíntota vertical (poderia ser outra!)

Como $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ vejamos que $x = -1$ é uma assíntota ao gráfico de f :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2}{x+1} = +\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2}{x+1} = -\infty, \text{ logo } x = -1 \text{ é uma}$$

assíntota vertical (bilateral).

9.3)

$$f'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \wedge (x+1)^2 \neq 0 \Leftrightarrow x(x+2) = 0 \wedge x \neq -1$$

$$\Leftrightarrow (x = 0 \vee x = -2) \wedge x \neq -1$$

- **Pontos críticos:** $x = -2$ e $x = 0$.

obs: $x = -1$ apesar de não pertencer ao domínio de f' , não é ponto crítico uma vez que $x = -1 \notin D_f$.

x	$-\infty$	-2		-1		0	$+\infty$
Sinal de f'	+	0	-	não definida	-	0	+
F	$\nearrow$		$\searrow$	não definida	$\searrow$		$\nearrow$

- **Extremos relativos:**

_ **máximo relativo:** em $x = -2$;

_ **mínimo relativo:** em $x = 0$.

- **Intervalos de monotonia:**

_ **estritamente crescente:** em $]-\infty, -2[$ e $]0, +\infty[$;

_ **estritamente decrescente:** em $]-2, -1[$ e $]-1, 0[$;

9.4)

$$f''(x) = \frac{(2x+2)(x+1)^2 - (x^2+2x)2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{(2x+2)(x+1) - 2(x^2+2x)}{(x+1)^3} = \frac{2}{(x+1)^3}$$

f'' não tem zeros. O seu domínio é $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, logo -1 é o único ponto a considerar para fazer o quadro.

obs: $x = -1$ apesar de não pertencer ao domínio de f'' , não é ponto candidato a ponto de inflexão uma vez que $x = -1 \notin D_f$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Sinal de f''	-	não definida	+
f	$\cap$	não definida	$\cup$

- **Pontos de inflexão:** não tem, apesar de à volta de $x = -1$ f mudar o sentido da concavidade, $x = -1 \notin D_f$.

- **Intervalos de concavidade:**

_ **concavidade voltada para baixo:** em $]-\infty, -1[$;

_ **concavidade voltada para cima:** em $]-1, +\infty[$;

Exercício 10

10.1) As funções $h(x) = \ln(x)$ e $f(x) = \frac{x+k}{3}$ são contínuas, a primeira porque é uma função logaritmo e a segunda porque é polinomial. Assim, como $\ln\left(\frac{x+k}{3}\right)$ é a composta da função $h(x)$ com a função $f(x)$:

$$(h \circ f)(x) = h(f(x)) = h\left(\frac{x+k}{3}\right) = \ln\left(\frac{x+k}{3}\right)$$

então $\ln\left(\frac{x+k}{3}\right)$ é a composta das duas funções contínuas (h e f) logo também é contínua, no intervalo $]0;+\infty[$.

As funções $h(x) = \sqrt{x}$ e $f(x) = -x$ são contínuas, a primeira porque é a função raiz quadrada e a segunda porque é polinomial. Assim, como $\sqrt{-x}$ é a composta da função $h(x)$ com a função $f(x)$:

$$(h \circ f)(x) = h(f(x)) = h(-x) = \sqrt{-x}$$

então $\sqrt{-x}$ é a composta das duas funções contínuas (h e f) logo também é contínua, no intervalo $]-\infty;0[$.

10.2) Pela alínea anterior sabemos que a função é contínua em $]0;+\infty[$ e $]-\infty;0[$. Para ser contínua (em todo o seu domínio, i.e. $\mathbb{R}$) temos apenas de verificar a continuidade no ponto $x = 0$.

A função é contínua no ponto $x = 0$ se existe $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$, e temos:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+k}{3}\right) = \ln\left(\frac{k}{3}\right)$$

$$g(0) = \ln\left(\frac{k}{3}\right)$$

Logo, para que exista $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$ tem que se verificar

$$\ln\left(\frac{k}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow e^0 = \frac{k}{3} \Leftrightarrow 1 = \frac{k}{3} \Leftrightarrow k = 3.$$

Portanto o valor de k para o qual $g(x)$ é $k = 3$.

10.3) Para $k = 1$ a função não é contínua em $x = 0$, logo não existe $g'(0)$.

Exercício 11

Sejam x e y o comprimento e a largura do rectângulo, respectivamente.

Queremos maximizar a área deste rectângulo, que é dada por $A = xy$ e sabemos que o perímetro P é

$$P = 10 \Leftrightarrow 2x + 2y = 10 \Leftrightarrow y = 5 - x$$

Então a função que queremos maximizar é $f(x) = x(5 - x) = 5x - x^2$.

Fazendo, $f'(x) = 5 - 2x$
 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 5 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$

	0	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
f'	+	0	-
f	$\nearrow$	Máx.	$\searrow$

Temos que $f\left(\frac{5}{2}\right)$ é um máximo.

Assim, para $x = \frac{5}{2}$ temos $y = 5 - \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$ e

portanto as dimensões dos lados que maximizam a área do rectângulo são:

$$x = \frac{5}{2} m \text{ e } y = \frac{5}{2} m.$$

Exercício 12

Cotação usada: 2 valores por alínea

12.1) $\int (x + x.e^{x^2}) dx = \int x dx + \frac{1}{2} \int 2x.e^{x^2} dx = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} e^{x^2} + C$, com $C \in \mathbb{R}$

12.2) $\int \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$; Substituição a efectuar: $t = \sqrt{x} \Rightarrow dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Leftrightarrow 2dt = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

Temos então,
$$\int \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = \int \ln(t) \cdot 2dt = 2 \int \ln(t) dt$$

Este integral calcula-se por partes:
$$\int \ln(t) dt = \int 1 \cdot \ln(t) dt$$

Cálculo auxiliar:
$$u' = 1 \Rightarrow u = t \qquad \text{I.P.P: } \int u' \cdot v = u \cdot v - \int u \cdot v'$$

$$v = \ln(t) \Rightarrow v' = 1/t$$

Logo,
$$2 \int \ln(t) dt = 2 \left(t \cdot \ln(t) - \int t \cdot \frac{1}{t} dt \right) = 2t \cdot \ln(t) - 2 \int dt = 2t \cdot \ln(t) - 2t + C$$
, com $C \in \mathbb{R}$

Substituindo t pela variável original, a solução é:

$$2\sqrt{x}[\ln(\sqrt{x}) - 1] + C, \text{ com } C \in \mathbb{R}$$

Método alternativo: directamente por partes

$$\int \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(\sqrt{x}) dx; \quad u' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow u = \sqrt{x}$$

$$v = \ln(\sqrt{x}) \Rightarrow v' = \frac{1}{2x}$$

Temos então,
$$\int \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(\sqrt{x}) dx = 2 \left[\sqrt{x} \cdot \ln(\sqrt{x}) - \int \frac{\sqrt{x}}{2x} dx \right] =$$

$$= 2\sqrt{x} \ln(\sqrt{x}) - \int x^{-1/2} dx = 2\sqrt{x} \ln(\sqrt{x}) - \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} \ln(\sqrt{x}) - 2\sqrt{x} + C$$
, com

$C \in \mathbb{R}$

12.3)
$$\int \frac{x^3 - 4x^2 + 5x + 1}{x^2 - 4x + 4} dx = \int \left(x + \frac{x+1}{x^2 - 4x + 4} \right) dx$$
 (procedendo à divisão dos polinómios)

Tudo se resume, pois ao cálculo do integral
$$\int \frac{x+1}{x^2 - 4x + 4} dx.$$

Em primeiro lugar factoriza-se ao máximo o denominador. Para tal, calculam-se as raízes do

Denominador:

$x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = 2$ (trata-se de uma raiz dupla)

$$\frac{x+1}{x^2-4x+4} = \frac{x+1}{(x-2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} = \frac{A(x-2)+B}{(x-2)^2}$$

Para que as fracções sejam iguais, os numeradores de ambas deverão ser iguais. Ou seja, os coeficientes dos termos de igual ordem nos polinómios deverão ser iguais:

$$x+1 = Ax - 2A + B$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ 1 = -2A + B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 3 \end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \left(x + \frac{x+1}{x^2-4x+4} \right) dx &= \int x dx + \int \frac{x+1}{x^2-4x+4} dx = \int x dx + \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{3}{(x-2)^2} dx = \\ &= \int x dx + \int \frac{1}{x-2} dx + 3 \int (x-2)^{-2} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x-2| + 3 \frac{(x-2)^{-1}}{-1} + C = \frac{x^2}{2} + \ln|x-2| - \frac{3}{x-2} + C \end{aligned}$$

com $C \in \mathbb{R}$.

Esta correcção foi realizada com a colaboração dos professores:

*Ana Ester Rodrigues;
Matias;
Vitor Sousa.*