Resolução

Grupo I

1) Considere a função definida por $g(x) = \pi - \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)$.

a) (1 val) Determine o domínio e o contradomínio da função g .

$$\begin{aligned} D_g &= \left\{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x^2 + \frac{1}{2} \leq 1\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : -\frac{3}{2} \leq x^2 \leq \frac{1}{2}\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : -\sqrt{\frac{1}{2}} \leq x \leq \sqrt{\frac{1}{2}}\right\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R} : -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right\} \end{aligned}$$

$CD_g = ?$

Para $x \in D_g$, resulta que: $\frac{1}{2} \leq x^2 + \frac{1}{2} \leq 1$

Logo, $\arccos(1) \leq \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \leq \arccos\left(\frac{1}{2}\right)$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \leq \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{3} \leq -\arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2\pi}{3} \leq \underbrace{\pi - \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)}_{g(x)} \leq \pi \quad \rightarrow \quad CD_g = \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$$

b) (0,5 val) Calcule, caso existam, os zeros de g .

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Leftrightarrow \pi - \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) = \pi \\ &\Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{2} = \cos(\pi) \\ &\Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{2} = -1 \\ &\Leftrightarrow x^2 = -\frac{3}{2} \quad \rightarrow \quad \text{Imp.} \end{aligned}$$

Logo, g não tem zeros.

c) (0,5 val) Mostre que a função g é par.

$$\begin{aligned} g(-x) &= \pi - \arccos\left((-x)^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= \pi - \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

Como $g(x) = g(-x)$, $\forall x \in D_g$, resulta que a função g é par.

d) (0,5 val) Comente a afirmação: “A função g não admite inversa.”

A afirmação é falsa.

Pela alínea *c* sabe-se que a função g é par, logo não é injectiva. Como não é injectiva também não pode ser invertível.

e) (1,5 val) Considere a função g restrita ao subconjunto não negativo de D_g e caracterize a sua inversa.

$$\begin{aligned}
g(x) = y &\Leftrightarrow \pi - \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) = y \\
&\Leftrightarrow \arccos\left(x^2 + \frac{1}{2}\right) = \pi - y \\
&\Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{2} = \cos(\pi - y) \\
&\Leftrightarrow x^2 = \cos(\pi - y) - \frac{1}{2} \\
&\Leftrightarrow x = \sqrt{\cos(\pi - y) - \frac{1}{2}}, \text{ porque } x \geq 0 \\
&\Leftrightarrow x = \sqrt{-\cos(y) - \frac{1}{2}}, \text{ porque } \cos(\pi - y) = -\cos(y)
\end{aligned}$$

O contradomínio da inversa de g é o domínio de g , que pelo enunciado é o subconjunto não negativo do D_g , ou seja, $\left[0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$. Para este domínio de g , o contradomínio mantém-se o mesmo, uma vez que g é par. Logo, o domínio da inversa de g é $\left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right]$.

Caracterização:

$$\begin{aligned}
g^{-1}: \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right] &\rightarrow \left[0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right] \\
x &\rightarrow \sqrt{-\cos(x) - \frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

2) (3 val) Indique o valor lógico das seguintes afirmações **justificando** devidamente a sua opção.

a) Para que uma função seja contínua num ponto basta que os limites laterais nesse ponto existam.

Afirmação falsa.

$$\text{Seja } f(x) = \begin{cases} 1 & , x = 0 \\ 0 & , x \neq 0 \end{cases}$$

Os limites laterais em $x = 0$ existem e são iguais a zero, no entanto a função não é contínua porque não se tem $\underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}_0 = \underbrace{f(0)}_1$.

b) Uma função contínua não pode ter assíntotas verticais.

Afirmção falsa.

Considere-se a função $f(x) = \frac{1}{x}$. Esta função é contínua (em todo o seu domínio, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$) e no entanto tem uma assíntota vertical, $x = 0$.

c) Considere a função $f(x) = \begin{cases} xe^x & \text{se } x \geq 0 \\ \frac{1}{x-2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$. Como $(xe^x)' = (1+x)e^x$ então

$$f'(0) = (1+0)e^0.$$

Afirmção falsa.

Para se obter $f'(0)$ é necessário recorrer à definição de derivada num ponto, uma vez que f muda de ramo em $x = 0$, ou seja, tem de se verificar se as derivadas laterais são iguais ou não.

d) O valor de $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}}$ é 1.

Afirmção verdadeira.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(\cos(x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin(x)}{\cos(x)}}{1}} = e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{\cos(x)}} = e^0 = 1$$

R.H.

.....

Grupo II

3) Considere as funções reais de variável real definidas por:

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad \text{e} \quad g(x) = \ln(x)$$

a) (1 val) Determine o domínio da função $f \circ g$ pela definição e calcule $(f \circ g)(e^2)$.

$$\begin{aligned} D_{f \circ g} &= \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \wedge g(x) \in D_f\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}^+ \wedge \ln(x) \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R}^+ \end{aligned} \quad \text{C.A.} \quad \left\{ \begin{array}{l} D_f = \{x \in \mathbb{R} : \underbrace{x^2 + 1 \neq 0}_{c.u.}\} = \mathbb{R} \\ D_g = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} = \mathbb{R}^+ \end{array} \right.$$

$$(f \circ g)(e^2) = f(g(e^2)) = f(\ln(e^2)) = f(2) = \frac{4}{5}$$

b) (1 val) Estude a monotonia e os extremos de f .

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = 0 \wedge \underbrace{(x^2 + 1)^2 \neq 0}_{\text{Cond. Universal}} \Leftrightarrow x = 0$$

		0	
<i>Sinal de $f'(x)$</i>	-	0	+
<i>Monotonia de $f(x)$</i>	$\searrow$	<i>Min.</i>	$\nearrow$

Resposta:

- f é decrescente em $]-\infty; 0[$
- f é crescente em $]0; +\infty[$
- f tem um mínimo em $x = 0$, que é $f(0) = 0$.

c) (0,75 val) Escreva a equação da recta tangente ao gráfico de f em $x = 1$

A equação da recta é: $y = mx + b$

$$m = f'(1) = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{1}{2}$$

$$y = f(1) = \frac{1}{2} \qquad \left(1; \frac{1}{2}\right) \in \text{recta} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 + b \Leftrightarrow b = 0$$

A equação da recta tangente a f em $x = 1$ é: $y = \frac{1}{2}x$

d) (0,75 val) Mostre que a função f satisfaz as condições do Teorema dos Valores Intermediários (ou Teorema de Bolzano) no intervalo $[0,1]$ e conclua que ele garante a existência de um elemento $c \in [0,1]$ tal que $f(c) = \frac{1}{4}$.

- f é contínua, porque é o quociente entre dois polinómios (funções contínuas) em que o denominador nunca se anula.
- $[0,1]$ é um intervalo fechado.
- $f(0) = 0$
- $f(1) = \frac{1}{2}$

Então, pelo Teorema de Bolzano, f assume todos os valores entre 0 e $\frac{1}{2}$, i.e.,

$$\forall y \in \left[0; \frac{1}{2}\right], \exists x \in [0;1]: f(x) = y$$

Como $\frac{1}{4} \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$, então f assume o valor $\frac{1}{4}$, i.e., $\exists c \in [0;1]: f(c) = \frac{1}{4}$.

- 4) (2,5 val) Determine dois números positivos, a e b , cujo produto seja quatro e que minimizam a soma dos seus quadrados, $a^2 + b^2$.

Pretende-se minimizar a função: $f = a^2 + b^2$, em que $a > 0$ e $b > 0$.

Como $a \cdot b = 4 \Leftrightarrow b = \frac{4}{a}$, então $f(a) = a^2 + \frac{16}{a^2}$.

Pontos críticos:

$$f'(a) = 2a - \frac{32}{a^3} = \frac{2a^4 - 32}{a^3}$$

$$f'(a) = 0 \Leftrightarrow \frac{2a^4 - 32}{a^3} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2a^4 - 32 = 0 \wedge a^3 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow a^4 = 16 \wedge a \neq 0$$

$$\Leftrightarrow a = 2 \quad \text{porque } a > 0$$

a	0	2	$+\infty$
<i>Sinal de $f'(a)$</i>	-	0	+
<i>Monotonia de $f(a)$</i>	$\searrow$	<i>Min.</i>	$\nearrow$

Resposta:

A soma é mínima quando $a = 2$ e $b = \frac{4}{2} = 2$.

.....

Grupo III

5) (1,5 val) Determine uma função F cuja derivada seja $f(x) = \frac{1}{x+2} - e^{2(x+1)}$ e tal que

$$\lim_{x \rightarrow -1} F(x) = 5.$$

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{x+2} - e^{2(x+1)} dx = \int \frac{1}{x+2} dx - \int e^{2(x+1)} dx = \ln|x+2| - \frac{1}{2} \int 2e^{2(x+1)} dx =$$

$$= \ln|x+2| - \frac{1}{2} e^{2(x+1)} + c$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} F(x) = 5 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \left(\ln|x+2| - \frac{1}{2} e^{2(x+1)} + c \right) = 5$$

$$\Leftrightarrow \ln(1) - \frac{1}{2} e^0 + c = 5$$

$$\Leftrightarrow 0 - \frac{1}{2} + c = 5$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{11}{2}$$

Logo, a função procurada é: $F(x) = \ln|x+2| - \frac{1}{2} e^{2(x+1)} + \frac{11}{2}$

6) Calcule as seguintes primitivas:

a) (1,5 val) $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ fazendo uma substituição adequada

Uma substituição a fazer pode ser: $t = \sqrt{x}$.

$$t = \sqrt{x} \rightarrow dt = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \Leftrightarrow 2dt = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

Substituindo, vem:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx &= \int \sqrt{1+t} \cdot 2 dt = 2 \int (1+t)^{1/2} dt = 2 \frac{(1+t)^{3/2}}{3/2} + c \\ &= \frac{4}{3} (1+t) \sqrt{1+t} + c = \frac{4}{3} (1+\sqrt{x}) \sqrt{1+\sqrt{x}} + c \end{aligned}$$

b) (2 val) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \underbrace{x^2}_g \underbrace{x(-x^2)^{-1/2}}_{f'} dx \\ &= -x^2(1-x^2)^{1/2} - \int -(1-x^2)^{1/2} 2x dx \\ &= -x^2(1-x^2)^{1/2} + 2 \int x(1-x^2)^{1/2} dx \\ &= -x^2(1-x^2)^{1/2} + 2 \left(-\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} \right) + c \\ &= -x^2\sqrt{1-x^2} - \frac{2}{3}(1-x^2)\sqrt{1-x^2} + c \\ &= \left(-\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3} \right) \sqrt{1-x^2} + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int x(1-x^2)^{-1/2} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int \underbrace{-2x}_{u'} \left(\underbrace{1-x^2}_u \right)^{-1/2} dx \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{1/2}}{1/2} \\ &= -(1-x^2)^{1/2} \end{aligned}$$

c) (2 val) $\int \frac{x^4 + 6x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} dx$

Como o grau do numerador é maior que o do denominador, tem que se dividir os polinómios,

$$\begin{array}{r} x^4 + 0x^3 + 6x^2 + x + 8 \\ -x^4 \qquad -4x^2 \\ \hline 2x^2 + x + 8 \end{array} \quad \begin{array}{l} |x^3 + 4x \\ x \end{array} \quad \rightarrow \quad x^4 + 6x^2 + x + 8 = x(x^3 + 4x) + 2x^2 + x + 8$$

Logo,

$$\frac{x^4 + 6x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} = x + \frac{2x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} \text{ e portanto,}$$

$$\int \frac{x^4 + 6x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} dx = \int x dx + \int \frac{2x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} dx = \frac{x^2}{2} + \int \frac{2x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} dx \quad (*)$$

Ora,

$$\frac{2x^2 + x + 8}{x^3 + 4x} = \frac{2x^2 + x + 8}{x(x^2 + 4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4} = \frac{(A+B)x^2 + Cx + 4A}{x(x^2 + 4)}$$

Para esta igualdade ser verificada tem que se ter:

$$\begin{cases} A+B=2 \\ C=1 \\ 4A=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B=0 \\ C=1 \\ A=2 \end{cases}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2+x+8}{x^3+4x} dx &= \int \frac{2}{x} dx + \int \frac{1}{x^2+4} dx \\ &= 2 \ln|x| + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\frac{x^2}{4}+1} dx \\ &= 2 \ln|x| + \frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} dx \\ &= 2 \ln|x| + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} dx \\ &= 2 \ln|x| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

Substituindo em (*), vem que:

$$\int \frac{x^4+6x^2+x+8}{x^3+4x} dx = \frac{x^2}{2} + 2 \ln|x| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right) + c$$

#