



# Capítulo 1 - Cálculo Matricial

Carlos Balsa

balsa@ipb.pt

Departamento de Matemática  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança

Matemática I - 1º Semestre 2011/2012



# Sumário

## Cálculo Vectorial

Grandezas Vectoriais

Operações com Vectores

Produto Escalar

# Sumário

## Cálculo Vectorial

- Grandezas Vectoriais
- Operações com Vectores
- Produto Escalar

## Cálculo Matricial

- Introdução
- Adição de Matrizes
- Multiplicação por um Escalar
- Transposta de uma matriz
- Multiplicação de Matrizes
- Matrizes Especiais



## Grandezas escalares e vectoriais

- ▶ Grandezas físicas escalares: massa, energia, volume...
- ▶ **Escalares**: quantidades que são descritas completamente por um só número (real ou complexo)




## Grandezas escalares e vectoriais


- ▶ Grandezas físicas escalares: massa, energia, volume...
- ▶ **Escalares**: quantidades que são descritas completamente por um só número (real ou complexo)
- ▶ Grandezas físicas vectoriais: velocidade, força, aceleração...
- ▶ **Vectores**: caracterizam-se pela sua dimensão, direcção e sentido

## Grandezas escalares e vectoriais

- ▶ Grandezas físicas escalares: massa, energia, volume...
- ▶ **Escalares**: quantidades que são descritas completamente por um só número (real ou complexo)
- ▶ Grandezas físicas vectoriais: velocidade, força, aceleração...
- ▶ **Vectores**: caracterizam-se pela sua dimensão, direcção e sentido
- ▶ Exemplos:



Vector velocidade no deslocamento de um ponto móvel ao longo da sua trajectória.



Força gravitacional exercida pela Terra sobre um satélite.




## Representação de um vector

- ▶ Sequência de escalares em linha  $[v_1 v_2 \dots v_n]$  ou coluna

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

## Representação de um vector

- ▶ Sequência de escalares em linha  $[v_1 v_2 \dots v_n]$  ou coluna  $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$
- ▶ Cada escalar corresponde a uma coordenada ou componente num referencial cartesiano
- ▶ Exemplos:  $v = [x \ y] \in \mathbb{R}^2$  e  $u = [x \ y \ z] \in \mathbb{R}^3$




## Adição de Vectores

- ▶ Seja  $v = [v_1 \ v_2 \dots \ v_n]$  e  $u = [u_1 \ u_2 \dots \ u_n]$  dois vectores de  $\mathbb{R}^n$
- ▶ **Adição:**  $v + u = [v_1 + u_1 \ v_2 + u_2 \dots \ v_n + u_n] \in \mathbb{R}^n$
- ▶ **Subtracção:**  $v - u = [v_1 - u_1 \ v_2 - u_2 \dots \ v_n - u_n] \in \mathbb{R}^n$

## Adição de Vetores

- ▶ Seja  $v = [v_1 \ v_2 \dots v_n]$  e  $u = [u_1 \ u_2 \dots u_n]$  dois vetores de  $\mathbb{R}^n$
- ▶ **Adição:**  $v + u = [v_1 + u_1 \ v_2 + u_2 \dots v_n + u_n] \in \mathbb{R}^n$
- ▶ **Subtração:**  $v - u = [v_1 - u_1 \ v_2 - u_2 \dots v_n - u_n] \in \mathbb{R}^n$
- ▶ **Geometricamente:**



## Multiplicação por um escalar

- ▶ **Multiplicação por um escalar:** se  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $\alpha v = v\alpha \in \mathbb{R}^n$

## Multiplicação por um escalar

- ▶ **Multiplicação por um escalar:** se  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $\alpha v = v\alpha \in \mathbb{R}^n$ 
  - ▶ Direcção de  $\alpha v$  é igual à de  $v$
  - ▶ Sentido de  $\alpha v$  é igual ao de  $v$  se  $\alpha > 0$
  - ▶ Sentido de  $\alpha v$  é contrário ao de  $v$  se  $\alpha < 0$
  - ▶ Dimensão de  $\alpha v$  é maior do que a de  $v$  se  $|\alpha| > 1$
  - ▶ Dimensão de  $\alpha v$  é menor do que a de  $v$  se  $|\alpha| < 1$



## Propriedade

- ▶ Sejam  $u$ ,  $v$  e  $w$  vetores arbitrários de  $\mathbb{R}^n$ ; sejam  $\alpha$  e  $\beta$  dois escalares arbitrários reais, então  $u + v \in \mathbb{R}^n$ :
  1.  $u + v = v + u$
  2.  $u + (v + w) = (v + u) + w$
  3. Existe um vector  $0$  em  $\mathbb{R}^n$  tal que  $u + 0 = 0 + u = u$  para todo o  $u \in \mathbb{R}^n$
  4. Existe um vector  $-u$  em  $\mathbb{R}^n$  tal que  $u + (-u) = (-u) + u = 0$  para todo o  $u \in \mathbb{R}^n$



## Propriedade

- ▶ Sejam  $u$ ,  $v$  e  $w$  vetores arbitrários de  $\mathbb{R}^n$ ; sejam  $\alpha$  e  $\beta$  dois escalares arbitrários reais, então  $u + v \in \mathbb{R}^n$ :
  1.  $u + v = v + u$
  2.  $u + (v + w) = (v + u) + w$
  3. Existe um vector  $0$  em  $\mathbb{R}^n$  tal que  $u + 0 = 0 + u = u$  para todo o  $u \in \mathbb{R}^n$
  4. Existe um vector  $-u$  em  $\mathbb{R}^n$  tal que  $u + (-u) = (-u) + u = 0$  para todo o  $u \in \mathbb{R}^n$
- ▶  $\alpha u \in \mathbb{R}^n$  ( $\mathbb{R}^n$  é fechado em relação à multiplicação por um escalar)
  1.  $\alpha(u + v) = \alpha v + \alpha u$
  2.  $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$
  3.  $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$
  4.  $1u = u$

## Producto Escalar

- ▶ Seja  $v = [v_1 \ v_2 \dots v_n]$  e  $u = [u_1 \ u_2 \dots u_n]$  dois vectores de  $\mathbb{R}^n$

## Producto Escalar

- ▶ Seja  $v = [v_1 \ v_2 \dots v_n]$  e  $u = [u_1 \ u_2 \dots u_n]$  dois vectores de  $\mathbb{R}^n$

- ▶ Vector **transposto** de  $u$ , representado por  $u^T$ , é

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

## Produto Escalar

- ▶ Seja  $v = [v_1 \ v_2 \dots v_n]$  e  $u = [u_1 \ u_2 \dots u_n]$  dois vectores de  $\mathbb{R}^n$

- ▶ Vector **transposto** de  $u$ , representado por  $u^T$ , é

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

- ▶ **Norma** do vector  $v$  representa o seu comprimento, é dada por

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

## Produto Escalar

▶ Seja  $v = [v_1 \ v_2 \dots v_n]$  e  $u = [u_1 \ u_2 \dots u_n]$  dois vetores de  $\mathbb{R}^n$

▶ Vector **transposto** de  $u$ , representado por  $u^T$ , é

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

▶ **Norma** do vector  $v$  representa o seu comprimento, é dada por

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

▶ **Produto escalar (ou interno)** de  $v$  por  $u$  é dado por


$$v \cdot u^T = [v_1 \ v_2 \dots v_n] \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = v_1 u_1 + v_2 u_2 + \dots + v_n u_n$$

## Projecção de um Vector

- ▶ **Componente** de um vector  $v$  sobre um vector  $u$  é dada por  $C_u(v) = \|v\| \cos(\theta)$ , com  $\theta = \angle(v, u)$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ )

## Projeção de um Vector

- ▶ **Componente** de um vector  $v$  sobre um vector  $u$  é dada por  $C_u(v) = \|v\| \cos(\theta)$ , com  $\theta = \angle(v, u)$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ )
- ▶ Vector **projecção** de  $v$  sobre um vector  $u$  é dada por  $proj_u(v) = C_u(v) \frac{u}{\|u\|}$





## Producto Escalar, continuación

- ▶ Prova-se que  $v \cdot u^T = \|v\| \|u\| \cos(\theta)$ , isto é,  $v \cdot u^T = C_u(v) \|u\|$



## Produto Escalar, continuação

- ▶ Prova-se que  $v \cdot u^T = \|v\| \|u\| \cos(\theta)$ , isto é,  $v \cdot u^T = C_u(v) \|u\|$
- ▶  $v \cdot u^T$  representa o produto da componente de  $v$  sobre  $u$ , vezes a norma de  $u$ ; se  $u$  for unitário  $v \cdot u^T$  representa apenas a componente de  $v$  sobre  $u$
- ▶  $v \cdot u^T = 0$  se  $u$  e  $v$  forem **ortogonais** (perpendiculares)



## Produto Escalar, continuação

- ▶ Prova-se que  $v \cdot u^T = \|v\| \|u\| \cos(\theta)$ , isto é,  $v \cdot u^T = C_u(v) \|u\|$
- ▶  $v \cdot u^T$  representa o produto da componente de  $v$  sobre  $u$ , vezes a norma de  $u$ ; se  $u$  for unitário  $v \cdot u^T$  representa apenas a componente de  $v$  sobre  $u$
- ▶  $v \cdot u^T = 0$  se  $u$  e  $v$  forem **ortogonais** (perpendiculares)
- ▶  $v \cdot v^T = \|v\|^2$

## Propriedade do Produto Escalar

- Se  $u$ ,  $v$  e  $w$  são vectores linha em  $\mathbb{R}^n$  e  $\alpha$  é um escalar, então:
1.  $u \cdot u^T > 0$  para todo  $u \neq 0$ ,  $u \cdot v^T = 0$  se e só se  $u = 0$
  2.  $u \cdot v^T = v \cdot u^T$
  3.  $(u + v) \cdot w^T = u \cdot w^T + v \cdot w^T$
  4.  $\alpha(u) \cdot v = u \cdot (\alpha v) = \alpha(u \cdot v)$



## Exercício 1

Seja  $v = [2 \ 2 \ -1]$  e  $u = [2 \ 0 \ 1]$  dois vectores de  $\mathbb{R}^3$

1. Calcule  $v \cdot u^T$
2. Calcule  $\|v\|$  e  $\|u\|$
3. Calcule a componente de  $v$  sobre  $u$
4. Calcule o vector projecção de  $v$  sobre  $u$
5. Obtenha um vector ortogonal a  $u$

## Matrizes

- Um arranjo rectangular de  $m \times n$  escalares (reais ou complexos) distribuídos por linhas ou colunas designa-se matriz de ordem (ou do tipo)  $m \times n$ :

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}_{n \text{ colunas}} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}} \right\} m \text{ linhas}$$

## Elementos de um Matrizes

- ▶ Os números  $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$  são designados por elementos (ou entradas) da matriz  $A$
- ▶ Matriz  $A = [a_{ij}]$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$  e  $j = 1, 2, \dots, n$

$$\text{linha } i \left[ \begin{array}{ccc} \vdots & & \\ \dots & a_{ij} & \dots \\ & \vdots & \end{array} \right]$$

coluna j

- ▶ Matriz é um conjunto de vectores linha ou coluna, um vector é uma matriz linha ou coluna



## Matrizes Quadradas

- ▶ **Matriz quadrada**: número de linhas igual ao número de colunas

## Matrizes Quadradas

- ▶ **Matriz quadrada**: número de linhas igual ao número de colunas
- ▶ Elementos  $a_{11}$ ,  $a_{22}$ ,  $\dots$ ,  $a_{nn}$  de uma matriz quadrada de ordem  $n$  formam a chamada **diagonal principal**, se todos os elementos são nulos fora da diagonal principal temos uma **matriz diagonal**
- ▶ Exemplos de matrizes quadradas:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

## Igualdade de Matrizes

Dadas as matrizes  $A = [a_{ij}]$  com  $i = 1, \dots, p$  e  $j = 1, \dots, q$  e  $B = [b_{ij}]$ , com  $i = 1, \dots, m$  e  $j = 1, \dots, n$ , dir-se-ão iguais se, e só se:

1.  $A$  e  $B$  tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas ( $p = m$  e  $q = n$ )
2. Se todos os elementos correspondentes das duas matrizes forem iguais, isto é,  $a_{ij} = b_{ij}$  para todos  $i = 1, \dots, m$  e  $j = 1, \dots, n$ . Então podemos escrever  $A = B$

## Adição (ou subtracção) de Matrizes

- ▶ Se  $A = [a_{ij}]$  e  $B = [b_{ij}]$  com  $i = 1, 2, \dots, m$  e  $j = 1, 2, \dots, n$  define-se a matriz soma destas duas matrizes como sendo a matriz  $C = [c_{ij}]$  de ordem  $m \times n$  cujos elementos são dados por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \quad \text{e } j = 1, 2, \dots, n$$

Podemos então escrever que  $C = A + B$

## Adição (ou subtracção) de Matrizes

- ▶ Se  $A = [a_{ij}]$  e  $B = [b_{ij}]$  com  $i = 1, 2, \dots, m$  e  $j = 1, 2, \dots, n$  define-se a matriz soma destas duas matrizes como sendo a matriz  $C = [c_{ij}]$  de ordem  $m \times n$  cujos elementos são dados por:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \quad \text{e } j = 1, 2, \dots, n$$

Podemos então escrever que  $C = A + B$

- ▶ Da mesma forma a subtracção de  $A$  por  $B$  resulta numa matriz  $C = [c_{ij}]$  de ordem  $m \times n$  cujos elementos são dados por:

$$c_{ij} = a_{ij} - b_{ij} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \quad \text{e } j = 1, 2, \dots, n$$

Podemos então escrever que  $C = A - B$

## Adição e Subtracção de Matrizes, Exemplo

► Sejam  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & -2 \\ 5 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix}$

## Adição e Subtracção de Matrizes, Exemplo

- ▶ Sejam  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & -2 \\ 5 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix}$
- ▶ Se chamarmos  $C$  à soma das matrizes  $A$  e  $B$ , então

$$C = A+B = \begin{bmatrix} 1+(-4) & 0+3 & 2+(-2) \\ 5+5 & 3+5 & 1+1 \\ 6+3 & 4+4 & 2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 10 & 8 & 2 \\ 9 & 8 & 11 \end{bmatrix}$$

## Adição e Subtracção de Matrizes, Exemplo

▶ Sejam  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & -2 \\ 5 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix}$

- ▶ Se chamarmos  $C$  à soma das matrizes  $A$  e  $B$ , então

$$C = A+B = \begin{bmatrix} 1+(-4) & 0+3 & 2+(-2) \\ 5+5 & 3+5 & 1+1 \\ 6+3 & 4+4 & 2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 10 & 8 & 2 \\ 9 & 8 & 11 \end{bmatrix}$$

- ▶ Se chamarmos  $D$  à subtracção das matrizes  $A$  e  $B$ , então

$$D = A-B = \begin{bmatrix} 1-(-4) & 0-3 & 2-(-2) \\ 5-5 & 3-5 & 1-1 \\ 6-3 & 4-4 & 2-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

## Propriedades da Adição de Matrizes

Se as matrizes  $A$ ,  $B$  e  $C$  tiverem dimensões  $m \times n$ , verifica-se:

- ▶  $A + B = B + A$
- ▶  $A + (B + C) = (A + B) + C$
- ▶ Existe uma única matriz  $0$ , chamada **matriz nula**, com as mesmas dimensões de  $A$  tal que  $A + 0 = A$
- ▶ Existe uma única matriz  $B$ , representada por  $-A$ , com as mesmas dimensões de  $A$  tal que  $A + B = 0$

## Multiplicação de uma Matrizes por um Escalar

- ▶ A multiplicação de uma matriz  $A = [a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , por um escalar  $\alpha$  é definida pela matriz  $B = [b_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , obtida multiplicado cada elemento da matriz pelo escalar:

$$b_{ij} = \alpha a_{ij}, \quad \text{para } i = 1, \dots, m \text{ e } j = 1, \dots, n$$

Diz-se que a matriz  $B$  é um múltiplo escalar da matriz  $A$

## Multiplicação de uma Matrizes por um Escalar

- ▶ A multiplicação de uma matriz  $A = [a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , por um escalar  $\alpha$  é definida pela matriz  $B = [b_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , obtida multiplicado cada elemento da matriz pelo escalar:

$$b_{ij} = \alpha a_{ij}, \quad \text{para } i = 1, \dots, m \text{ e } j = 1, \dots, n$$

Diz-se que a matriz  $B$  é um múltiplo escalar da matriz  $A$

- ▶ Exemplo: o produto da matriz  $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$  pelo escalar  $-2$

é dado por

$$-2A = \begin{bmatrix} (-2)5 & (-2)(-3) \\ (-2)0 & (-2)(-2) \\ (-2)3 & (-2)0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 6 \\ 0 & 4 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$$

## Propriedades da Multiplicação por um Escalar

Seja  $A$  uma matriz  $m \times n$  e  $\alpha$  e  $\beta$  dois escalares (reais ou complexos), verifica-se:

- ▶  $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$
- ▶  $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
- ▶  $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$



## Transposta de uma matriz

- ▶ Se  $A$  é uma matriz  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , então a matriz  $A^T = [a_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$  é chamada de **transposta** de  $A$

## Transposta de uma matriz

- ▶ Se  $A$  é uma matriz  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , então a matriz  $A^T = [a_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$  é chamada de **transposta** de  $A$

- ▶ Exemplo: sejam  $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

## Transposta de uma matriz

- ▶ Se  $A$  é uma matriz  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , então a matriz  $A^T = [a_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$  é chamada de **transposta** de  $A$

- ▶ Exemplo: sejam  $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ -3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -3 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

## Transposta de uma matriz

- ▶ Se  $A$  é uma matriz  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , então a matriz  $A^T = [a_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$  é chamada de **transposta** de  $A$

- ▶ Exemplo: sejam  $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ -3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -3 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

- ▶ Propriedades:  $(A^T)^T = A$  e  $(A + B)^T = A^T + B^T$

## Transposta de uma Matriz Complexa

- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **conjugada**  $\bar{A} = [\bar{a}_{ij}]$  para  $i = 1, \dots, m$  e  $j = 1, \dots, n$

## Transposta de uma Matriz Complexa

- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **conjugada**  $\bar{A} = [\bar{a}_{ij}]$  para  $i = 1, \dots, m$  e  $j = 1, \dots, n$
- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **transposta-conjugada**  $A^H = \bar{A}^T = [\bar{a}_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$

## Transposta de uma Matriz Complexa

- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **conjugada**  $\bar{A} = [\bar{a}_{ij}]$  para  $i = 1, \dots, m$  e  $j = 1, \dots, n$
- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **transposta-conjugada**  $A^H = \bar{A}^T = [\bar{a}_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$

▶ Exemplo: sejam  $A = \begin{bmatrix} 5 + 2i & -3i \\ 4 + i & 2 - 8i \\ 3 & 1 + 2i \end{bmatrix}$

▶  $\bar{A} = \begin{bmatrix} 5 - 2i & 3i \\ 4 - i & 2 + 8i \\ 3 & 1 - 2i \end{bmatrix}$  e  $A^H = \begin{bmatrix} 5 - 2i & 4 - i & 3 \\ 3i & 2 + 8i & 1 - 2i \end{bmatrix}$

## Transposta de uma Matriz Complexa

- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **conjugada**  $\bar{A} = [\bar{a}_{ij}]$  para  $i = 1, \dots, m$  e  $j = 1, \dots, n$
- ▶ Se  $A$  é uma matriz complexa  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$ , define-se a sua **transposta-conjugada**  $A^H = \bar{A}^T = [\bar{a}_{ji}]$  para  $j = 1, \dots, n$  e  $i = 1, \dots, m$

▶ Exemplo: sejam  $A = \begin{bmatrix} 5 + 2i & -3i \\ 4 + i & 2 - 8i \\ 3 & 1 + 2i \end{bmatrix}$

▶  $\bar{A} = \begin{bmatrix} 5 - 2i & 3i \\ 4 - i & 2 + 8i \\ 3 & 1 - 2i \end{bmatrix}$  e  $A^H = \begin{bmatrix} 5 - 2i & 4 - i & 3 \\ 3i & 2 + 8i & 1 - 2i \end{bmatrix}$

- ▶ Propriedades:  $(A^H)^H = A$  e  $(A + B)^H = A^H + B^H$

## Multiplicação de Matrizes

Se  $A$  é uma matriz  $[a_{ij}]$ , de dimensão  $m \times p$ , e  $B = [B_{ij}]$ , de dimensão  $p \times n$  então o produto de  $A$  por  $B$ , denotado de  $AB$ , é a matriz  $C = [C_{ij}]$ , de dimensão  $m \times n$  definida por

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{e} \quad j = 1, \dots, n$$

- ▶  $c_{ij}$  é o produto escalar do vector linha  $i$  de  $A$  pelo vector coluna  $j$  de  $B$

## Multiplicação de Matrizes, continuação

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jp} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & a_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & a_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & a_{p2} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & a_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = C
 \end{aligned}$$

## Multiplicação de Matrizes, continuação

- ▶ Número de colunas de  $A$  tem de ser igual ao número de linhas de  $B$
- ▶ Número de linhas de  $AB$  é igual ao número de linhas de  $A$  e número de colunas de  $AB$  é igual ao número de colunas de  $B$

$$\underbrace{\quad}_A \underbrace{\quad}_B = \underbrace{\quad}_{AB}$$
$$m \times p \quad p \times n = m \times n$$

## Multiplicação de Matrizes, exemplo

► Sejam  $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{bmatrix} (5)(3) + (-3)(2) & (5)(-3) + (-3)(-2) & (5)(1) + (-3)(2) \\ (0)(3) + (-2)(2) & (0)(-3) + (-2)(-2) & (0)(1) + (-2)(2) \\ (3)(3) + (0)(2) & (3)(-3) + (0)(-2) & (3)(1) + (0)(2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 15 - 6 & -15 + 6 & 5 - 6 \\ 0 - 4 & 0 + 4 & 0 - 4 \\ 9 + 0 & -9 + 0 & 3 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -9 & -1 \\ -4 & 4 & -4 \\ 9 & -9 & 3 \end{bmatrix}$$

## Propriedades da Multiplicação de Matrizes

Seja  $A$  uma matriz  $m \times p$ ,  $B$  e  $C$  duas matrizes com a mesma dimensão  $p \times n$  e  $\alpha$  um escalar:

- ▶  $A(BC) = (AB)C$
- ▶  $A(B + C) = AB + AC$
- ▶  $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
- ▶  $(AB)^T = B^T A^T$
- ▶  $(\alpha A)^T = \alpha A^T$



## Matrizes Especiais

- ▶  $A$  é **simétrica** se  $A = A^T$
- ▶  $A$  é **hermitiana** se  $A = A^H$
- ▶  $A$  é **normal** se  $AA^T = A^T A$
- ▶  $A$  é **unitária** se  $AA^H = A^H A$



## Matrizes Identidade

- ▶ O produto de matrizes não é comutativo em geral ( $AB \neq BA$ ), mas apenas em particular para algumas matrizes especiais

## Matrizes Identidade

- ▶ O produto de matrizes não é comutativo em geral ( $AB \neq BA$ ), mas apenas em particular para algumas matrizes especiais
- ▶ Se  $A$  for uma matriz quadrada,  $n \times n$ , e existir uma matriz  $B$ , com a mesma dimensão, tal que  $AB = BA = A$ , diz-se que  $B$  é a **identidade** de  $A$  e é representada por  $I$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

## Matriz Inversa

- ▶ Se  $A$  for uma matriz quadrada,  $n \times n$ , e existir uma matriz  $B$ , com a mesma dimensão, tal que  $AB = BA = I$ , diz-se que  $B$  é a **inversa** de  $A$  (ou vice-versa) e é representada por  $A^{-1}$
- ▶ Sejam as matrizes  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{bmatrix} (2)(-1) + (3)(1) & (2)(\frac{3}{2}) + (3)(-1) \\ (2)(-1) + (2)(1) & (2)(\frac{3}{2}) + (2)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como  $AB = I$  podemos afirmar que  $B = A^{-1}$  ( $B$  é inversa de  $A$ ) ou que  $A = B^{-1}$  ( $A$  é inversa de  $B$ )

## Matriz Ortogonal

- ▶ Se  $A$  for uma matriz quadrada,  $n \times n$ , e se verificar  $AA^T = A^T A = I$ , diz-se que  $A$  é **ortogonal**

## Matriz Ortogonal

- ▶ Se  $A$  for uma matriz quadrada,  $n \times n$ , e se verificar  $AA^T = A^T A = I$ , diz-se que  $A$  é **ortogonal**

- ▶ Seja a matriz  $A = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$

- ▶ Como

$$AA^T = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

podemos afirmar que  $A$  é ortogonal

## Bibliografia

- ▶ Bernard Kolman, "Introdução à Álgebra Linear com Aplicações", Prentice-Hall do Brasil, 1998
- ▶ Eduardo J.C. Martinho, J. da Costa Oliveira e M. Amaral Fortes, "Matemática para o Estudo da Física". Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.